Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR

H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy

Centrální pracoviště drogové epidemiologie

V ý r o č n í z p r á v a

ČR – 2002

Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy

léčených uživatelů drog

PRAHA
březen 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR

MUDr. Vladimír Polanecký

Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Hygienická stanice hl. m. Prahy:

Prof. MUDr. Jan Šejda, DrSc.

MUDr. Běla Studničková

MUDr. Jan Klika

MUDr. Jana Šeblová

Ivana Bártů

Rybalkova 39
100 00 Praha 10

tel.: 271 087 200, 271 742 704
fax. 271 087 204
e-mail: drogy@hygpraha.cz

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

OBSAH

OBSAH **1**

SEZNAM TABULEK 2
SEZNAM GRAFŮ 4

ÚVOD **6**

ZDROJE INFORMACÍ, DEFINICE A METODIKA **7**

INCIDENCE A PREVALENCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG **11**

SOCIOEKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY 11
ROČNÍ INCIDENCE A PREVALENCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG A KATEGORIZACE DROG 13
REGIONÁLNÍ DISTRIBUCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG 15
VĚKOVÁ DISTRIBUCE 16
ZPŮSOB APLIKACE DROG A FREKVENCE JEJICH UŽÍVÁNÍ 18
KOMBINACE DROG 20
Tabulky, grafy *21*

INCIDENCE A PREVALENCE PROBLÉMOVÝCH UŽIVATELŮ DROG **70**

Tabulky *71*

ODHAD PREVALENCE VŠECH PROBLÉMOVÝCH UŽIVATELŮ DROG V ČR **74**

Tabulky *76*

VIROVÉ HEPATITIDY A, B, C **78**

VIROVÁ HEPATITIDA A 78
VIROVÁ HEPATITIDA B 78
VIROVÁ HEPATITIDA C 78
Tabulky, grafy *80*

HIV/AIDS U INJEKČNÍCH NARKOMANŮ **92**

Tabulky *93*

INFORMACE O VÝMĚNNÉM PROGRAMU STŘÍKAČEK A JEHEL ZA ROK 2002 ..... **96**

INTOXIKACE DROGAMI (VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ÚMRTÍ) **102**

Tabulky, grafy *108*

PLNĚNÍ METADONOVÉHO PROGRAMU V ROCE 2002 ..... **121**

Tabulky *123*

TRENDY INCIDENCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG ZA OBDOBÍ 1995 – 2002 ..... **124**

Tabulky, grafy *129*

HLAVNÍ ZÁVĚRY D I S ZA ROK 2002 ..... **157**

Příloha:

Databáze léčebných kontaktních center v ČR k 31.12.2002

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Seznam tabulek:

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog

1. Léčebně/kontaktní centra podle typu 21
2. Léčebná / kontaktní centra podle krajů 22
3. Léčebná / kontaktní centra podle typu zařízení a krajů 23
4. Motiv či důvod návštěvy L/K centra 24
5. S kým žijí uživatelé drog 25
6. Charakter bydlení uživatelů drog žádajících o léčbu 26
7. Národnost uživatelů drog žádajících o léčbu 27
8. Charakter zaměstnání uživatelů drog žádajících o léčbu 28
9. Charakter zaměstnání uživatelů drog žádajících o léčbu podle krajů 29
10. Nejvyšší dokončené vzdělání uživatelů drog žádajících o léčbu 30
11. Incidence, prevalence, specifická věková incidence a prevalence na 100 000 obyvatel v ČR a podle krajů 31
12. Základní droga podle pohlaví - skupiny drog 32
13. Základní droga podle skupin drog a krajů - noví klienti v roce 2002 (FTD) 33
14. Základní droga podle skupin drog a krajů – všichni klienti v roce 2002 34
15. Věkové skupiny uživatelů drog - žadatelů o léčbu podle pohlaví 35
16. Základní drogy a skupiny drog podle věkových skupin - muži 36
17. Základní drogy a skupiny drog podle věkových skupin - ženy 37
18. Základní drogy a skupiny drog podle věkových skupin – celkem 38
19. Věková distribuce uživatelů drog - žadatelů o léčbu – incidence v roce 2002 39
20. Věková distribuce uživatelů drog - žadatelů o léčbu – prevalence v roce 2002 40
21. Průměrný věk uživatelů drog - žadatelů o léčbu podle skupin základní drogy a pohlaví 41
22. Věk prvního užití základní drogy podle základní drogy a věkových skupin 42
23. Způsob aplikace základní drogy - muži 43
24. Způsob aplikace základní drogy - ženy 44
25. Způsob aplikace základní drogy - celkem 45
26. Injekční uživatelé drog podle věku – ze všech léčených uživatelů drog a nově zachycených (FTD) 46
27. Injekční aplikace jakékoliv drogy v současnosti / kdykoliv dříve podle pohlaví 47
28. Injekční aplikace jakékoliv drogy všemi klienty v současnosti / kdykoliv dříve - podle základní drogy 47
29. Věk prvního injekčního užití drogy 48
30. Frekvence užití základní drogy 49
31. Drogy užívané v kombinaci se základní drogou 50
32. Drogy užívané v kombinaci se základní drogou podle skupin základní drogy 51
33. Pořadí oblíbenosti / dostupnosti drog v procentech 52

Incidence a prevalence problémových uživatelů drog

34. Problémoví uživatelé drog podle pohlaví 71
35. Problémoví uživatelé drog podle způsobu aplikace 71
36. Problémoví uživatelé drog podle pohlaví a věkových skupin 72
37. Incidence, prevalence, specifická věková incidence a prevalence problémových uživatelů drog na 100 000 obyvatel v ČR a podle krajů 73

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Odhad prevalence všech problémových uživatelů drog v ČR

38. Odhad prevalence všech problémových uživatelů opiátů, amfetaminů a injekčních 76
39. Odhad prevalence všech problémových uživatelů opiátů, amfetaminů a injekčních podle pohlaví 77

Virové hepatitidy A, B a C

40. Virová hepatitida typu A 80
41. Virová hepatitida typu B 81
42. Virová hepatitida typu C 82
43. Virová hepatitida typu A podle krajů 83
44. Virová hepatitida typu B podle krajů 84
45. Virová hepatitida typu C podle krajů 85
46. Vyšetření markerů virových hepatitid A, B, C u nově evidovaných injekčních problémových uživatelů heroinu a pervitinu v roce 2002 86
47. Vyšetření markerů virových hepatitid A, B, C u všech injekčních problémových uživatelů heroinu a pervitinu v roce 2002 87

HIV / AIDS u injekčních narkomanů

48. Hlášené případy HIV pozitivní a případy AIDS – ČR*) 93
49. Vyšetření HIV u nově zachycených injekčních problémových uživatelů heroinu a pervitinu 94
50. Vyšetření HIV u všech injekčních problémových uživatelů heroinu a pervitinu 95

Intoxikace v souvislosti s užitím drogy

51. Intoxikovaní podle hlásícího zařízení a krajů 108
52. Základní droga podle pohlaví 109
53. Drogy užívané v kombinaci se základní drogou podle pohlaví 110
54. Základní droga podle krajů 111
55. Skupiny základní drogy podle věkových skupin a pohlaví 112
56. Základní droga podle věkových skupin – srovnání počtu intoxikací v letech 2001 a 2002 113
57. Základní droga podle frekvence užití 114
58. Způsob aplikace základní drogy podle pohlaví 115
59. Základní droga podle příčiny 116
60. Základní droga podle typu bydliště 117
61. Základní droga podle typu zaměstnání 118

Plnění metadonového programu v roce 2002

62. Registr metadonové léčby - stav k 1. lednu 2003 123

Trendy incidence léčených uživatelů drog za období 1995 - 2002

63. Základní data 1995 – 2002 (*1. část)* 129
64. Základní data 1995 – 2002 dle EMCDDA *(2. část)* 130
65. Podíl osob s rizikovým chováním podle věkových skupin (v % ve věkové skupině) - srovnání let 1997 - 2002 131
66. Výskyt virové hepatitidy typu A, B a C a podíl injekčních narkomanů - srovnání let 1997 – 2002 132

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Seznam grafů:

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog

graf č. 1: Léčebně/kontaktní centra podle typu zařízení
graf č. 2: klienti podle typu zařízení
graf č. 3: Zaměstnání nově evidovaných a všech léčených uživatelů drog
graf č. 4: Skupiny základních drog – proporcionální zastoupení (nově evidovaní klienti – FTD)
graf č. 5: Skupiny základních drog – proporcionální zastoupení (všichni klienti)
graf č. 6: Specifická incidence a prevalence ve věkové skupině 15 - 39 let/100 000 obyvatel – srovnání ČR a krajů
graf č. 7: Skupiny základní drogy podle krajů – nově evidovaní klienti
graf č. 8: Skupiny základní drogy podle krajů – všichni klienti
graf č. 9: Léčení uživatelé drog podle věku – všichni klienti v roce 2002
graf č. 10: Průměrný věk uživatelů vybraných drog podle pohlaví
graf č. 11: Věk prvního užití základní drogy nově evidovanými klienty podle věkových skupin
graf č. 12: Věk prvního užití základní drogy všemi klienty podle věkových skupin
graf č. 13: Způsob aplikace základní drogy
graf č. 14: Podíl injekčních uživatelů drog ve věkových skupinách
graf č. 15: Frekvence užívání základní drogy
graf č. 16: Drogy užívané novými klienty jako základní a sekundární
graf č. 17: Drogy užívané všemi klienty jako základní a sekundární

Virové hepatitidy A, B, C

graf č. 18: Virová hepatitida A,B, C podle věkových skupin
graf č. 19: Virová hepatitida A,B, C – podíl osob s rizikovým chováním podle věku
graf č. 20: Podíl injekčních narkomanů na celkovém počtu hepatitid
graf č. 21: Poměr injekčních narkomanů z celkového počtu hlášených virových hepatitid A, B, C

Intoxikace v souvislosti s užitím drogy

graf č. 22: Intoxikace drogami – podíl skupin základní drogy
graf č. 23: Intoxikace drogami – intoxikované osoby podle věkových skupin

Trendy incidence léčených uživatelů drog za období 1995 - 2002

graf č. 24: Trendy prvně léčených uživatelů drog – nově zachycení uživatelé drog ve věku 15-39 let a jejich specifická věková incidence
graf č. 25: Trendy - problémoví uživatelé opiátů a stimulancií a jejich incidence
graf č. 26: Trendy – počet nově registrovaných uživatelů heroinu a pervitinu a jejich kumulace
graf č. 27: Průměrný věk nově registrovaných uživatelů vybraných drog
graf č. 28: Trend podílu mužů a žen u uživatelů pervitinu
graf č. 29: Trend podílu mužů a žen u uživatelů heroinu
graf č. 30: Počet nově registrovaných injekčních uživatelů drog a jejich kumulace
graf č. 31: Počet nově registrovaných injekčních uživatelů heroinu a pervitinu a jejich kumulace
graf č. 32: Trend podílu způsobu aplikace mezi uživateli heroinu

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

graf č. 33: Trend podílu způsobu aplikace mezi uživateli pervitinu
graf č. 34: Trendy prvně léčených uživatelů drog ČR 1995 – 2002
graf č. 35: Trendy prvně léčených uživatel drog – doba užívání heroinu u mužů před návštěvou L/K centra, doba užívání heroinu u žen před návštěvou L/K centra
graf č. 36: Trend podílu užívání vybraných drog jako základní a sekundární droga
graf č. 37: Trendy počtu nově evidovaných problémových uživatelů drog 15 - 39 let, injekčních uživatelů drog, uživatelů opiátů a stimulancií / 100 000 obyvatel v Praze, v kraji Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Vysočina, Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském, Moravskoslezském a v České republice (*část 1 – 5*)
graf č. 38: Virová hepatitida A – trend podílu osob s rizikovým chováním podle věkových skupin nemocných
graf č. 39: Virová hepatitida B – trend podílu osob s rizikovým chováním podle věkových skupin nemocných
graf č. 40: Virová hepatitida C – trend podílu osob s rizikovým chováním podle věkových skupin nemocných
graf č. 41: Podíl injekčních uživatelů drog mezi nemocnými virovou hepatitidou A, B, C
graf č. 42: Trend podílu skupin základní drogy
graf č. 43: Trend podílu věkových skupin intoxikovaných osob

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

ÚVOD

Situace na naší drogové scéně v roce 2002 je charakterizována zlepšenou hlásící morálkou L/K center, kdy se podařilo shromáždit data z 96 % pracovišť. Současně je restrukturalizována celá koncepce výroční zprávy - jak v oblasti sledování prevalence klientů, tak i v analýze léčených problémových osob dle definice EMCDDA.

Komentář ke sledovaným zdravotním i sociodemografickým ukazatelům je dostatečně zpracován v jednotlivých kapitolách. Závažným fenoménem je stále stoupající incidence léčených uživatelů drog, což určitě není v souladu s uklidňujícími závěry o účinnosti primární prevence a harm reduction, kterými jsme obšťastňováni hlavně v mediích i těmi, kteří se drogovou problematikou profesionálně zabývají. Snad právě proto.

Jsou i pozitivní zjištění, např. zvyšující se věk léčených uživatelů, ale i nízký počet identifikovaných HIV pozitivních injekčních narkomanů.

Nárůst incidence léčených uživatelů drog kopíruje nárůst incidence virové hepatitidy B a pokračuje stále stejný je výskyt "likvidační" hepatitidy C, ze které navíc vidíme jen špičku ledovce, neboť nepostihujeme chronické nosiče-zdroje. Průřezová vyšetření léčených uživatelů drog jsou odborně a ekonomicky neefektivní, nevypovídající. Jejich vyšetřování a analýza musí být pouze v rukou epidemiologů KHS, nikoliv náhodných dobrovolných "odborníků"!

S mezinárodními geopolitickými změnami, včetně boje proti terorizmu, nápadně koreluje nedostatek heroinu v nabídce drog a jeho nahrazování stále dostupným pervitinem.

Již celou řadu let doporučuji výstupy z práce hygienické služby alespoň prolistovat, už vůbec si netroufám říci, že by se z nich někdo měl poučit - a to na všech úrovních praxe i politiky. Přesto se občas objevuje, na rozdíl od opakovaného hodnocení EMCDDA, i znevažování práce hygienické služby na úseku drogové epidemiologie, dokonce i s tím, že je podkladů málo! Ten kdo to říká, ať si skutečně o drogové epidemiologii v předložené publikaci počte!

MUDr. Vladimír Polanecký
Národní koordinátor drogové epidemiologie

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

ZDROJE INFORMACÍ, DEFINICE A METODIKA

Drogový informační systém (DIS) provozovaný Hygienickou službou shromažďuje čtvrtletně informace o počtech uživatelů drog, kteří žádají o léčebnou, poradenskou či sociální službu v některém z tzv. léčebně/ kontaktních center, což jsou zdravotnická i nezdravotnická zařízení, poskytující tyto služby (dále L/K centra).

Užité definice :

Incidence léčených uživatelů drog v roce 2002 – všichni nově evidovaní uživatelé drog – žadatelé o první léčbu v životě (First Treatment Demand – FTD) v průběhu roku 2002.

Prevalence léčených uživatelů drog v roce 2002 – všichni uživatelé drog , kteří v průběhu roku 2002 alespoň jedenkrát navštívili některé ze zařízení, poskytujících péči osobám užívajícím drogy.

Problémové užívání drog – injekční užívání drog a/nebo dlouhodobé a pravidelné užívání opiátů a/nebo kokainu a/nebo drog amfetaminového typu.

Incidence problémových uživatelů drog v roce 2002 – všichni nově evidovaní problémoví uživatelé drog – žadatelé o první léčbu v životě (FTD) v průběhu roku 2002.

Prevalence problémových uživatelů drog v roce 2002 – všichni problémoví uživatelé drog, kteří v průběhu roku 2002 alespoň jedenkrát navštívili některé ze zařízení, poskytujících péči osobám užívající drogy

Jak v incidenci tak i v prevalenci je každý klient vykazován pouze jedenkrát, bez ohledu na počet jeho návštěv v příslušném zařízení či návštěvy ve více z těchto zařízení. Incidenci a prevalenci problémových uživatelů drog je ve výroční zprávě věnována samostatná kapitola, doplněná o odhad celkové prevalence problémových uživatelů drog v roce 2002.

Léčebně kontaktní centrum (L/K) – zdravotnické či nezdravotnické zařízení, poskytující léčebnou, poradenskou či sociální službu osobám užívajícím drogy. Tato L/K centra jsou ve smyslu doporučení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogově závislé (EMCDDA) rozlišena do 3 kategorií.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Typy L/K center:

- nízkoprahová zařízení
- ambulantní zařízení
- lůžková zařízení

Všechny následující informace (kromě intoxikací v souvislosti s užitím drogy a částečně i virových hepatitid) se týkají pouze těch uživatelů drog, kteří alespoň jedenkrát byli v roce 2002 v kontaktu s některým L/K centrem. Stávající DIS neumožňuje zachytit ani experimentující část populace, která ještě nemá zdravotní či jiné problémy, které by ji motivovaly k návštěvě L/K centra, ani tzv. skrytou populaci (prakticky problémové uživatele), kteří - alespoň zatím - jakoukoliv pomoc odmítají.

Informace o experimentující populaci je možno získat pomocí cílených dotazníkových studií – většinou zaměřených na školní populaci (Mládež a drogy, ESPAD). Informace o tzv. skryté populaci problémových uživatelů drog vycházejí jednak z kvalifikovaných odhadů expertů, případně jsou odhady jejich prevalence uskutečňovány pomocí různých metod, lišících se dostupností a spolehlivostí užitých zdrojů dat.

Odhad celkové prevalence všech problémových uživatelů drog vychází v této výroční zprávě z hlášené prevalence léčených problémových uživatelů drog a tzv. in-treatment rate (ITR), což je procentuální vyjádření odhadu počtu problémových uživatelů drog léčených v L/K centrech k počtu všech problémových uživatelů drog.

Informace o **incidenci a prevalenci všech léčených uživatelů drog** byly v roce 2002 získány z celkem 293 L/K center z celkového počtu 305 L/K center databáze celé ČR (*tab. č. 1*). Procento vykazujících LK center přesáhlo 96 % . Dvanáct nám známých L/K center, která pravidelně léčí uživatele drog a zatím nespolupracují s DIS, tvoří pouze 4 % existujících pracovišť a mají podle odhadu podíl klientů kolem 2 %.

Ve srovnání s rokem 2001 bylo sice 30 L/K center z databáze vyřazeno (většinou se jednalo o psychiatrické či psychologické ordinace, které sice byly ochotny spolupracovat, ale nejsou na klientelu uživatelů drog zaměřeny a neléčily žádného takového klienta). Na druhé straně přibylo nových 89 L/K center. Nárůst je dán především rozšířením databáze o

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

pracoviště, která sice neevidují nové uživatele drog tj. incidenci, ale podílejí se na hlášení prevalence. Jde zejména o terapeutické komunity, doléčovací centra a některá ambulantní zařízení.

V databázi jsou nejčastěji zastoupena ambulantní zařízení, ať již zdravotnická či nezdravotnická. Celkem jich bylo koncem roku 2002 evidováno 167 (*graf č.1*). Na hlášené incidenci, resp. prevalenci se však podílejí pouze v 22,5 %, resp. 20 %. Uživateli drog jsou nejčastěji navštěvována nízkoprahová zařízení, zejména ve větších městech, která se podílejí na 60,4 % nově evidovaných klientů a 56,4 % ze všech klientů v roce 2002 (*graf č. 2*).

V *tabulkách č. 2* a *3* je uvedena distribuce evidovaných L/K center v jednotlivých krajích ČR a rozčlenění vykazující L/K center podle jejích typu. Nejvíce L/K center se nachází v Moravskoslezském kraji (46 hlásících ze 49 evidovaných).

Hodnocení dostatečnosti sítě L/K center v jednotlivých krajích by mohlo být zavádějící. Evidence nových klientů víceméně dobře odráží skutečnou incidenci uživatelů drog, ale evidence všech léčených klientů již může být zkreslena. Např. v Jihočeském kraji existující 4 zařízení běžně přijímají klienty z jiných krajů, což zvyšuje počty všech léčených klientů v rámci kraje, tedy prevalenci. Jiným příkladem je situace v Karlovarském či Pardubickém kraji, kde neexistují detoxifikační lůžka ani psychiatrické léčebny, a proto lze předpokládat, že prevalence uživatelů bydlících v těchto krajích bude naopak podhodnocena.

Databáze L/K center s počty nových i již dříve léčených uživatelů drog za rok 2002 je v příloze této zprávy.

Informace o incidenci **virových hepatitid A, B, C,** jejichž výskyt má souvislost s rizikovým chováním, jsou získávány prostřednictvím automatizovaného systému hlášení infekčních onemocnění EPIDAT. K dispozici jsou ještě údaje o výsledcích vyšetření laboratorních markerů virových hepatitid, které je v některých L/K centrech nabízeno injekčním uživatelům drog. Tato část zprávy je doplněna o dostupné informace o výměnném **programu jehel a stříkaček**, realizovaném prostřednictvím L/K center.

Zdrojem informací o **výskytu HIV/AIDS** u injekčních narkomanů je Národní referenční laboratoř pro HIV /AIDS ve Státním zdravotním ústavu.

Sledování výskytu **akutních intoxikací**, ke kterým došlo v souvislosti s užitím drogy, slouží jako další nepřímý zdravotní indikátor při monitorování drogové scény. Sběr informací

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

pokračoval v uplynulém roce systémem tzv. sentinelových pracovišť, zhruba pokrývajících bývalá krajská města. Nejkompletnější informace jsou pravděpodobně z Prahy.

Informace **o metadonovém programu** v ČR byly získány z MZČR.

Výroční zprávu završuje poslední kapitola, ve které jsou zachyceny **trendy** vybraných charakteristik uživatelů drog, druhů užívaných drog a výskytu virových hepatitid u osob s rizikovým chováním.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

INCIDENCE A PREVALENCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG

Socioekonomické charakteristiky

Užívaný formulář pro evidenci léčených uživatelů drog – klientů L/K center – poskytuje informace o vybraných socioekonomických charakteristikách těchto osob.

V *tabulce č. 4* jsou uvedeny okolnosti, které uživatele drog vedly či dokonce přiměly k návštěvě L/K centra a žádosti o léčebnou, poradenskou či sociální službu. Více než dvě třetiny léčených uživatelů drog přišlo do L/K center z vlastního rozhodnutí, event. pod vlivem některého z rodinných příslušníků. Sociální služba, soudy či policie jsou jako iniciátoři návštěvy v L/K centru uváděny pouze ve zhruba 6 %.

Asi polovina všech léčených uživatelů drog žije s rodiči, často klient udává, že žije pouze sám. Závažné jsou informace o tom, že spolu s uživatelem drog žijí děti, ať již s partnerem či bez něj (*tabulka č. 5*).

Tabulka č. 6 dokumentuje zhoršující se socioekonomickou situaci u osob dlouhodobě užívajících drogy. Osob s přechodným bydlištěm, osob umístěných v nějakém zařízení či dokonce bezdomovců je výrazně víc mezi opakovaně léčenými a dlouhodobými uživateli drog než mezi žadateli o prvé léčení.

Mezi nově evidovanými uživateli drog bylo 139 osob s jinou než českou národností, mezi všemi uživateli drog v roce 2002 pak 245 osob. U poměrně značného počtu uživatelů drog nebyla národnost uvedena (*tabulka č. 7*). Nejčastěji mezi všemi klienty byla kromě české uvedena národnost slovenská a romská.

Podobnou situaci dokumentuje *tabulka č. 8* a *graf č. 3* zachycující charakter zaměstnání léčených uživatelů drog. Pravidelné zaměstnání vykazuje pouze 591 uživatelů drog v incidenci, mezi všemi klienty je to 1364 osob. Nezaměstnaných či pouze příležitostně pracujících bylo mezi žadateli o prvou léčbu 2016 (42,7 %), mezi všemi klienty již 4657 osob (tj. 50,4 %).

Tabulka č. 9 zachycuje rozdílnou situaci v zaměstnanosti léčených uživatelů drog v jednotlivých krajích. Nezaměstnané uživatele drog nacházíme nejčastěji v Ústeckém, Plzeňském a Olomouckém kraji, nejméně jsou zastoupeni ve Středočeském kraji, kraji Vysočina a Libereckém kraji.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Poslední ze socioekonomických charakteristik se zaměřuje na nejvyšší dosažené vzdělání klientů LK center (*tabulka č. 10*). Více než 50 % z nich má pouze základní či dokonce nedokončené základní vzdělání. Druhou nejčastější kategorií jsou klienti se střední školou bez maturity. Vyšší či vysokoškolské vzdělání uvádí pouze zanedbatelný počet léčených uživatelů drog. Užívání drog je tedy nepřímo úměrné s dosaženým vzděláním.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Roční incidence a prevalence léčených uživatelů drog a kategorizace drog

Celkový počet nově evidovaných klientů v LK centrech za rok 2002 byl 4 719 osob, tj. incidence 45,9/100 000 obyvatel. Věkově specifická incidence ve skupině 15-39letých byla 4 460 osob, tj. 118,1/100 000 obyvatel této věkové skupiny (*tabulka č. 11*). Ve srovnání s předchozím rokem došlo opět ke zvýšení incidence léčených uživatelů drog a lze konstatovat, že v roce 2002 byla dosažena nejvyšší roční incidence od roku 1995.

Prevalence všech léčených uživatelů drog v roce 2002 byla 9 237 osob, tj. 89,9/100 000 obyvatel, specifická prevalence ve věkové skupině 15 –39 let byla 8 760 osob, tj. 231,9/100 000 obyvatel.

Počty nově evidovaných uživatelů drog a všech léčených uživatelů drog v roce 2002 podle základní drogy a pohlaví jsou uvedeny v *tabulce č. 12*, proporcionální zastoupení jednotlivých skupin drog je na *grafu č. 4*.

Mezi nově evidovanými uživateli drog bylo 3 173 mužů (67,2%) a 1 524 žen (32,3%), u 22 osob pohlaví neuvedeno. Mezi všemi léčenými klienty bylo 6 302 mužů (68,2%) a 2 895 žen (31,3%), u 40 osob pohlaví neuvedeno.

Kromě toho bylo z L/K center nahlášeno 216 resp. 314 gamblerů, převážně mužů.

Mezi žadateli o prvou léčbu nejčastěji zastoupenou skupinou drog jsou stimulancia, celkem 2 595 osob, tj. 55,0 % ze všech nově evidovaných klientů. Samotný pervitin udává 2 389 osob, tj. 50,6 %. Druhou nejčastější skupinou drog jsou kanabinoidy – celkem 1 070 osob, tj. 22,7 %, samotná marihuana 1 068 osob. Na třetím místě jsou opiáty – celkem 787 osob, tj. 16,0 %, z toho heroin 675 osob, tj. 14,3 % ze všech nově evidovaných uživatelů drog.

Mezi všemi klienty léčenými v průběhu roku 2002 v L/K centrech zůstávají nejčastěji užívanou skupinou drog stimulancia (4 831 osob, tj. 52,3 %), samotný pervitin pak 4 589 osob, tj. 49,7 %. Na druhém místě jsou již opiáty – celkem 2 353 osob, tj. 25,5 %, z toho heroin 2 060 osob, tj. 22,3 % ze všech klientů léčených v roce 2002. Kanabinoidy, konkrétně marihuana, jsou jako základní droga udávány více než 16 % ze všech léčených uživatelů drog. Uživatelé rozpustidel vykazují sice mezi všemi klienty dvojnásobný počet než mezi prvně léčenými, ale procentuální zastoupení je v obou případech stejné, tj. 3,6 %. Relativně četné zastoupení mají i uživatelé extáze (193 prvně léčených osob, resp. 218 ze

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

všech evidovaných léčených osob). Na *grafu č. 5* je zachycen vzájemný poměr mužů a žen podle jednotlivých skupin drog a to zvlášť pro žadatele o první léčbu a pro všechny léčené klienty. Z grafu je vidět, že tento poměr se v podstatě nemění.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Regionální distribuce léčených uživatelů drog

Incidence, prevalence i specifická věková incidence a prevalence léčených uživatelů drog podle krajů je v *tabulce č. 11* a *grafu č. 6*. Počty nově evidovaných uživatelů drog podle skupin základní drogy stejně jako počty všech klientů v roce 2002 podle skupin základní drogy v jednotlivých krajích jsou v *tabulkách č. 13, 14* a *grafech č.7, 8*.

Nejvyšší incidence na 100 000 obyvatel je v Ústeckém kraji (89,6/100 000 obyvatel), následuje Jihomoravský kraj (59,5/100 000 obyvatel), nejvyšší prevalenci má opět Ústecký kraj (198,3/100 000 obyvatel), následuje kraj Jihomoravský (119,0/100 000 obyvatel) a Praha (112,2/100 000 obyvatel).

Nejvyšší počty nově evidovaných klientů jsou v Ústeckém kraji (741 osob), následuje kraj Jihomoravský (677 osob) a Praha (572 osob). Stejné je pořadí krajů i v počtech všech klientů za rok 2002.

Procentuální zastoupení uživatelů heroinu je nejvyšší v Praze (mezi nově evidovanými uživateli je to 38,6 %, mezi všemi klienty dokonce 53,5 %). Heroin je silně zastoupen i v krajích Ústeckém a Jihočeském.

Mezi nově evidovanými uživateli pervitinu má výrazné procentuální zastoupení zejména kraj Pardubický, ale i Jihomoravský a Královéhradecký; podobně je tomu i mezi všemi klienty za rok 2002.

Ze vzájemného zastoupení jednotlivých skupin drog lze uzavřít, že problematika heroinu dominuje v Praze a částečně v Ústeckém a Jihočeském kraji, v ostatních krajích mají výraznou převahu uživatelé pervitinu.

Kanabinoidy jako základní droga jsou nejčastěji vykazovány v krajích Vysočina a ve Středočeském kraji, rozpustidla v krajích Moravskoslezském a Zlínském.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Věková distribuce

Věk uživatelů drog představuje jeden z nejvýznamnějších ukazatelů, charakterizujících drogovou scénu. V *tabulce č. 15 a grafu č. 9* je uvedena věková distribuce uživatelů drog podle věkových skupin a pohlaví, včetně rozlišení mezi žadateli o první léčbu a všemi klienty za rok 2002.

Mezi žadateli o první léčbu jsou nejpostiženější věkovou skupinou 15 - 19letí. Celkem 1 892 nově evidovaných žadatelů o léčbu v této věkové skupině znamená incidenci 273,9/100 000 obyvatel této věkové skupiny (*tabulka č. 16*). V pořadí míry postižení druhou věkovou skupinou jsou 20 - 24letí, 1 579 osob znamená incidenci 181,4/100 000 obyvatel.

Mezi všemi léčenými klienty pozorujeme posun do starších věkových skupin. Nejpostiženější věkovou skupinou jsou 20 – 24letí, 3 427 osob znamená prevalenci 393,5/100 000 této věkové skupiny. Druhou skupinou v pořadí jsou 15 - 19letí, 2 650 osob znamená prevalenci 380,4/100 000 obyvatel. Mladistvých uživatelů do 15 let věku bylo mezi žadateli o prvou léčbu 108, mezi všemi klienty 121, tj. 2,3 %, resp. 1,3 %.

V *tabulkách č. 18, 19* a *20* jsou žadatelé o prvou léčbu i všichni klienti za rok 2002 – uživatelé jednotlivých skupin drog - rozčleněni do jednotlivých věkových skupin a pohlaví.

U dvou nejnebezpečnějších drog, heroinu a pervitinu lze pozorovat určité rozdíly mezi pohlavími. Ženy – uživatelky pervitinu – ve věkové skupině 15 – 19 let převažují nad muži jak mezi žadateli o prvou léčbu, tak i mezi všemi klienty. Muži – uživatelé heroinu – převažují ve všech věkových kategoriích nad ženami.

Tabulka č. 21 a *graf č. 10* udává průměrný věk uživatelů v době prvé návštěvy L/K centra v roce 2002.

Mezi žadateli o prvou léčbu je průměrný věk 21,8 roků, u všech klientů 23,4 roku. Průměrný věk uživatelů pervitinu je téměř o 2 roky nižší než u uživatelů heroinu. Významně mladší jsou pak uživatelé kanabinoidů a rozpustidel.

Aktuální situaci naší drogové scény ještě lépe vystihují informace o věku prvého užití základní drogy (*tabulka č. 22* a *grafy č. 11, 12*). Před dosažením věku 15ti let začalo užívat některou ze základních skupin drog již 768 uživatelů (16,2 %) žadatelů o prvou léčbu a 1 313 osob (14,2 %) ze všech léčených klientů .

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Určitý rozdíl nacházíme i mezi začínajícími uživateli heroinu a pervitinu. Zatímco u uživatelů heroinu začalo s užíváním do věku 19ti let 54 % prvožadatelů o léčbu a téměř 60 % ze všech uživatelů heroinu, pak u uživatelů pervitinu nevidíme prakticky žádný rozdíl mezi žadateli o prvou léčbu a všemi uživateli pervitinu. Do věku 19ti let jej začalo užívat zhruba 69 % těchto klientů. Zjištěná skutečnost je opět dokladem toho, že pervitin je nejenom rozšířenější drogou než heroin, ale také zřejmě dostupnější a s jeho užíváním se začíná dříve než s heroinem.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Způsob aplikace drog a frekvence jejich užívání

Způsob aplikace základní drogy podle jednotlivých skupin drog a pohlaví je v *tabulkách č. 23, 24, 25*.

Injekční aplikace drogy byla zaznamenána u žadatelů o první léčbu ve 2 610 případech, což je 55,3 % ze všech nově evidovaných uživatelů drog. Mezi všemi klienty v roce 2002 to bylo 5 909, tj. 64,0 %. Na druhém místě v aplikaci drog je kouření (1 133 osob u žadatelů o prvou léčbu, 1 615 mezi všemi klienty), čichání (575 versus 588 osob) a konečně požití (344 versus 608 osob).

Vzájemné zastoupení různých způsobů aplikace základní drogy je zachyceno na *grafu č. 13*. Injekční aplikaci mezi žadateli o prvou léčbu udává zhruba 55 % všech nově evidovaných uživatelů drog (36 % mužů a 19 % žen), mezi všemi klienty pak injekční aplikaci udává téměř 64 % uživatelů drog (mužů 42,9 % a žen 20,9 %).

Vezmeme-li v úvahu pouze nově evidované uživatele drog-muže pak mezi 3 173 jich 1 700 udává injekční aplikaci základní drogy což je 53,6 %. Mezi všemi klienty injekční aplikace u 3 963 mužů znamená 62,9 % ze všech uživatelů drog - mužů. Obdobně mezi 1 524 žadatelkami o prvou léčbu bylo 902 s injekční aplikací, což je 59,2 %; mezi všemi klientkami pak 1 920 případů injekční aplikace znamená 66,6 % ze všech uživatelek. Tato čísla znamenají, že injekční užívání je frekventovanější více u žen než u mužů.

Graf č. 14 zachycuje podíl injekčních uživatelů drog v jednotlivých věkových skupinách. Nejpostiženějšími jsou věkové skupiny 25 – 39 let a 20 – 24 let. Posun do starších věkových skupin je patrný zejména mezi všemi klienty léčenými v roce 2002.

Vezmeme-li v úvahu žadatele o první léčbu, kteří udávají injekční aplikaci základní drogy (2 610 osob) a k nim připočteme injekční užívání drogy sekundární u 150 osob, pak celkem 2 760 injekčních uživatelů představuje 58,5 % ze všech nově evidovaných v roce 2002 (*tabulka č. 26*). Mezi všemi klienty v roce 2002 udávalo injekční užívání základní drogy 5 909 osob a dalších 316 ještě užívalo injekčním způsobem drogu sekundární, tedy 6 225 osob s injekční aplikací, tj. 67,4%. Absolutně nejvyšší počty injekčních uživatelů drog jsou sice ve věkové skupině 20 - 24 let, procentuální zastoupení jednotlivých věkových skupin však staví na první místo věkovou skupinu 25 - 39 let.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Zajímavý pohled na problematiku injekčního užívání drog podávají *tabulky č. 27* a *28*. Injekční aplikaci jakékoliv drogy v současnosti udávalo 2 153 osob mezi nově evidovanými klienty a 4 277 mezi všemi klienty za rok 2002.

Heroin nikdy neužilo injekčním způsobem 116 osob, pervitin 439 osob. Za zmínku stojí 70 uživatelů kanabinoidů, kteří udávají injekční aplikaci nějaké drogy v současnosti a dalších 138 jich připouští injekční aplikaci drogy v minulosti.

Tabulka č. 25 také dokumentuje zajímavé zjištění. Mezi 2 389 nově evidovanými uživateli pervitinu bylo 1 950 s injekční aplikací, což je 81,6 %; mezi všemi klienty to bylo 85 % - 3 899 uživatelů s injekční aplikací ze všech 4 589 uživatelů pervitinu. Zcela jinak je tomu ale u uživatelek heroinu, kde mezi 675 žadatelkami o první léčbu bylo 591 s injekční aplikací (což je 87,5 %), zatímco nižší procento je mezi všemi uživatelkami heroinu (1 870 s injekční aplikací ze 2 060 osob, tj. 76,5 %). U značné části uživatelek heroinu časem dochází ke příznivé změně aplikace drogy, z injekčního užívání přecházejí na kouření či čichání.

Závažné údaje přináší *tabulka č. 29*, která nás informuje o věku prvého injekčního užití některé drogy. Do věku 19ti let to bylo 29,3 % ze všech nově evidovaných uživatelů drog a 34,2 % ze všech klientů v roce 2002. Již před dovršením 15ti let věku to bylo 3,2 %, resp. 4,1 %.

Formulář pro evidenci uživatelů drog žádajících o léčbu poskytuje také informace o frekvenci užívání základní drogy (*tabulka č. 30* a *graf č. 15*). Mezi žadateli o prvou léčbu uvádí denní užívání 1 011 uživatelů drog, dalších 1 456 užívá drogu 2 - 6x týdně. Mezi nově evidovanými uživateli užívá heroin denně 321 osob a pervitin 372 osob, mezi všemi klienty to je 975 uživatelů heroinu a 657 uživatelů pervitinu. Zatímco u uživatelů heroinu nacházíme jeho denní užívání zhruba u poloviny těchto uživatelů, u uživatelů pervitinu je to pouze asi 1/6 a daleko častěji se jedná o užívání 2 - 6 x týdně či pouze 1x týdně a méně. Za zmínku stojí i poměrně vysoká frekvence užívání drogy u těch klientů, kteří preferují rozpustidla.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Kombinace drog

Výčet všech dalších drog užívaných v kombinaci se základní drogou je uveden v *tabulce č. 31*. Nejčastěji užívanou sekundární drogou byla marihuana (1 278 osob u prvožadatelů a 2 661 osob u všech klientů v roce 2002), na druhém místě byl pervitin (543, resp. 1 323 osob), dále extáze (403, resp. 580 osob) a heroin (272, resp. 647 osob).

Z celkového počtu 9 237 všech uživatelů drog užilo v kombinaci druhou drogu 5 169 osob, z nich 1 890 užívá ještě třetí drogu; mezi 4 719 poprvé evidovanými klienty užívá druhou drogu 2 427 osob, ještě třetí pak 828 osob.

Grafické znázornění četnosti užívání jednotlivých skupin drog buď jako droga základní či jako droga sekundární je na *grafech č. 16, 17*.

V *tabulce č. 32* jsou uvedeny vzájemné kombinace u jednotlivých druhů základní drogy. Uživatelé heroinu jako základní drogy mají v oblibě jako sekundární drogu pervitin a kanabinoidy, uživatelé pervitinu výrazně preferují kanabinoidy a teprve na druhém místě heroin. Relativně velmi častá je kombinace kanabinoidů s alkoholem.

Vezmeme-li v úvahu počty uživatelů základních drog a k nim připočteme užívání dalších drog u stejných klientů, pak můžeme sestavit pořadí oblíbenosti, resp. dostupnosti drog (*tabulka č. 33*). Na prvém místě má výraznou převahu pervitin a to jak mezi žadateli o prvou léčbu, tak i mezi všemi klienty. Následuje marihuana, na třetím místě je heroin, na čtvrtém již extáze.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 1

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002 Léčebně/kontaktní centra podle typu

Typ L/K centra (kód)	L/K centra			Klienti							
	počet vykazujících center	počet existujících center	% vykazujících center	**počet všech klientů**	% ze všech klientů	z toho problémových uživatelů drog	% ze všech problémových uživatelů drog	**počet nově evidovaných klientů (FTD)**	% z nově evidovaných klientů	z toho nových problémových uživatelů drog	% z nových problémových uživatelů drog
Nízkoprahové (1)	76	77	*98,7*	5212	*56,4*	**4118**	***55,3***	2851	*60,4*	**2089**	***60,2***
Ambulantní - zdravotnická (2)	129	134	*96,3*	1815	*19,6*	**1381**	***18,6***	790	*19,6*	**514**	***14,8***
Ambulantní - nezdravotnická (2)	32	33	*97,0*	450	*4,9*	**292**	***3,9***	330	*4,9*	**180**	***5,2***
Lůžkové (3)	56	61	*91,8*	1760	*19,1*	**1650**	***22,2***	748	*15,9*	**689**	***19,8***
Celkem	**293**	**305**	***96,1***	**9237**	***100***	**7441**	***100***	**4719**	***100***	**3472**	***100***

Metodika	
Rok sběru dat	2002
Metoda sběru dat	hlášení na formulářích EMCDDA/TDI
Geografické pokrytí	ČR
Typ hlásících center	viz tabulka výše
Incidence (FTD)	nově registrovaní klienti v roce 2002 do 31. 12. 2002
Definice případu	první vyžádaná léčba v souvislosti s užíváním drogy v životě klienta
Kontrola duplicitních hlášení	podle kódu klienta (na úrovni kraje i ČR)
Prevalence	všichni klienti v roce 2002 do 31. 12. 2002
Definice případu	první léčba v souvislosti s užíváním drogy v příslušném kalendářním roce v jakémkoliv z L/K center
Kontrola duplicitních hlášení	podle kódu klienta (na úrovni kraje i ČR)
Poznámky	

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 2

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR – 2002 Léčebná / kontaktní centra podle krajů

Typ zařízení	Celkem evidovaná L/K centra	z toho:		Okresy nevykazující žádného nového klienta (incidence)
		hlásící	nehlásící	
Praha	29	27	2	Praha 3
Středočeský	26	26	0	Praha-východ, Rakovník
Jihočeský	21	21	0	
Plzeňský	15	14	1	
Karlovarský	7	6	1	
Ústecký	26	24	2	
Liberecký	15	15	0	
Královéhradecký	16	16	0	
Pardubický	8	8	0	Ústí nad Orlicí
Vysočina	22	22	0	
Jihomoravský	25	23	2	Vyškov
Olomoucký	24	23	1	
Zlínský	22	22	0	
Moravskoslezský	49	46	3	
Česká republika	**305**	**293**	**12**	
%	***100***	***96,1***	***3,9***	

Pozn.: V MČ Praha 3, v okresech Praha-východ a Rakovník nebylo evidováno žádné L/K centrum.

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 3

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Léčebná / kontaktní centra podle typu zařízení a krajů

Typ zařízení	Nízkoprahová	Ambulantní - zdravotnická	Ambulantní - nezdravotnická	Lůžková	Celkem L/K center
Praha	3	9	6	9	27
Středočeský	5	14	1	6	***26***
Jihočeský	8	6	1	6	**21**
Plzeňský	3	6	0	5	**14**
Karlovarský	3	3	0	0	**6**
Ústecký	11	6	2	5	**24**
Liberecký	3	7	3	2	**15**
Královéhradecký	2	10	2	2	**16**
Pardubický	1	6	1	0	**8**
Vysočina	8	5	2	7	**22**
Jihomoravský	6	12	1	4	**23**
Olomoucký	9	11	0	3	**23**
Zlínský	4	13	3	2	**22**
Moravskoslezský	10	21	10	5	**46**
Česká republika	**76**	**129**	**32**	**56**	**293**
%	***25,9***	***44,0***	***10,9***	***19,1***	***100***

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 4

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Motiv či důvod návštěvy L/K centra

Kdo klienta doporučil (N případů)	Všichni klienti v roce 2002				První léčení v roce 2002 (FTD)			
	Muži	Ženy	Neznámo	Celkem	Muži	Ženy	Neznámo	Celkem
1. Sám	3946	1796	21	**5763**	1838	864	12	**2714**
2. Rodina	701	396	4	**1101**	497	307	3	**807**
3. Jiné L/K centrum	363	171	5	**539**	81	34	2	**117**
4. Obvodní lékař	151	68	1	**220**	92	49	1	**142**
5. Lůžkové zdravotnické zařízení	168	76	0	**244**	64	28	0	**92**
6. Sociální služba	110	44	1	**155**	79	24	1	**104**
7. Soud, policie	310	93	4	**407**	150	49	0	**199**
8. Jiný	388	176	2	**566**	274	124	1	**399**
0. Neznámo	165	75	2	**242**	98	45	2	**145**
Celkem	**6302**	**2895**	**40**	**9237**	**3173**	**1524**	**22**	**4719**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 5

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR – 2002

S kým žijí uživatelé drog

S kým klient žije (N případů)	Všichni klienti v roce 2002				První léčení v roce 2002 (FTD)			
	Muži	Ženy	Neznámo	Celkem	Muži	Ženy	Neznámo	Celkem
1. Sám	981	257	9	**1247**	415	106	5	**526**
2. S rodiči	3119	1586	19	**4724**	1745	950	13	**2708**
3. Sám s dítětem	14	48	3	**65**	5	23	0	**28**
4. S partnerem	568	423	0	**991**	218	183	0	**401**
5. S partnerem a dětmi	158	104	1	**263**	59	37	0	**96**
6. S přáteli	598	194	4	**796**	269	91	3	**363**
7. Jiná možnost	423	156	2	**581**	206	63	1	**270**
0. Neznámo	441	127	2	**570**	256	71	0	**327**
Celkem	**6302**	**2895**	**40**	**9237**	**3173**	**1524**	**22**	**4719**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č.6

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Charakter bydlení uživatelů drog žádajících o léčbu

Charakter bydlení (N případů)	Všichni klienti v roce 2002				První léčení v roce 2002 (FTD)			
	Muži	Ženy	Neznámo	Celkem	Muži	Ženy	Neznámo	Celkem
1. Stálé bydliště	3988	2033	24	**6045**	2104	1133	15	**3252**
2. Přechodné bydliště	770	386	6	**1162**	327	168	2	**497**
3. V zařízení	357	126	4	**487*)**	167	48	3	**218**
4. Bezdomovec	550	129	5	**684**	220	51	2	**273**
0. Neznámo	637	221	1	**859**	355	124	0	**479**
Celkem	**6302**	**2895**	**40**	**9237**	**3173**	**1524**	**22**	**4719**

*) *Jako zařízení nejčastěji všemi klienty uvedeno:* diagnostický a výchovný ústav 114x, terapeutické komunity 80x, věznice 59x, azylový dům 24x, armáda spásy 18x, internát či domov mládeže 15x aj., ale také squat 8x a vojenský útvar 4x

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č.7

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Národnost uživatelů drog žádajících o léčbu

Národnost (N případů)	Všichni klienti v roce 2002				První léčení v roce 2002 (FTD)			
	Muži	Ženy	Neznámo	Celkem	Muži	Ženy	Neznámo	Celkem
1. Česká	5972	2806	37	**8815**	3003	1470	21	**4494**
2. Jiná – země EU	18	6	2	**26**	9	4	0	**13**
3. Jiná – ostatní země	178	40	1	**219**	98	27	1	**126**
0. Neznámo	134	43	0	**177**	63	23	0	**86**
Celkem	**6302**	**2895**	**40**	**9237**	**3173**	**1524**	**22**	**4719**

Pozn: Nejčastěji mezi všemi klienty uvedena národnost slovenská (115x), romská (60x), polská (12x), vietnamská (10x), ukrajinská (7x), ruská (6x), ostatní národnosti byly uvedeny 1x - 4x.

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 8

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Charakter zaměstnání uživatelů drog žádajících o léčbu

Charakter zaměstnání (N případů)	Všichni klienti v roce 2002				První léčení v roce 2002 (FTD)			
	Muži	Ženy	Neznámo	Celkem	Muži	Ženy	Neznámo	Celkem
1. Pravidelné	985	375	4	**1364**	422	168	1	**591**
2. Student / žák	1160	962	12	**2134**	864	674	10	**1548**
3. Důchodce (vč.invalidních), v domácnosti	133	119	0	**252**	35	38	0	**73**
4. Nezaměstnaný, příležitostná práce	3432	1205	20	**4657**	1480	529	7	**2016**
5. Jiná možnost	185	97	4	**286**	117	38	4	**159**
0. Neznámo	407	137	0	**544**	255	77	0	**332**
Celkem	**6302**	**2895**	**40**	**9237**	**3173**	**1524**	**22**	**4719**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 9

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Charakter zaměstnání uživatelů drog žádajících o léčbu podle krajů

Kraj	Všichni klienti v roce 2002													První léčení v roce 2002 (FTD)											
	Pravidelné		Student, žák		Důchodce, v dom.		Nezaměst., příležitost. práce		Jiná možnost		Neznámo		Cel-kem	Pravidelné		Student, žák		Důchodce, v dom.		Nezaměst., příležitost. práce		Jiná možnost		Neznámo		Cel-kem
	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%		Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	
raha	199	*15,0*	248	*18,7*	25	*1,9*	**682**	***51,4***	49	*3,7*	125	*9,4*	**1328**	76	*13,3*	178	*31,1*	10	*1,7*	**237**	***41,4***	19	*3,3*	52	*9,1*	**572**
tředočeský	140	*18,5*	274	*36,1*	12	*1,6*	**240**	***31,7***	41	*5,4*	51	*6,7*	**758**	58	*13,2*	221	*50,1*	3	*0,7*	**99**	***22,4***	22	*5,0*	38	*8,6*	**441**
hočeský	109	*21,3*	72	*14,1*	17	*3,3*	**289**	***56,4***	11	*2,1*	14	*2,7*	**512**	52	*21,8*	40	*16,7*	5	*2,1*	**126**	***52,7***	7	*2,9*	9	*3,8*	**239**
lzeňský	43	*13,8*	31	*10,0*	19	*6,1*	**194**	***62,4***	11	*3,5*	13	*4,2*	**311**	28	*13,0*	27	*12,6*	5	*2,3*	**136**	***63,3***	8	*3,7*	11	*5,1*	**215**
arlovarský	15	*8,9*	42	*24,9*	4	*2,4*	**100**	***59,2***	6	*3,6*	2	*1,2*	**169**	10	*10,2*	34	*34,7*	3	*3,1*	**46**	***46,9***	3	*3,1*	2	*2,0*	**98**
stecký	202	*12,3*	237	*14,5*	48	*2,9*	**1047**	***63,8***	40	*2,4*	66	*4,0*	**1640**	72	*9,7*	179	*24,2*	15	*2,0*	**417**	***56,3***	24	*3,2*	34	*4,6*	**741**
iberecký	57	*22,0*	85	*32,8*	10	*3,9*	**92**	***35,5***	5	*1,9*	10	*3,9*	**259**	26	*15,4*	79	*46,7*	5	*3,0*	**48**	***28,4***	3	*1,8*	8	*4,7*	**169**
rálovéhradecký	54	*25,8*	40	*19,1*	5	*2,4*	**85**	***40,7***	23	*11,0*	2	*1,0*	**209**	32	*21,6*	37	*25,0*	1	*0,7*	**60**	***40,5***	16	*10,8*	2	*1,4*	**148**
ardubický	43	*25,9*	35	*21,1*	2	*1,2*	**79**	***47,6***	0	*0,0*	7	*4,2*	**166**	34	*27,2*	31	*24,8*	2	*1,6*	**53**	***42,4***	0	*0,0*	5	*4,0*	**125**
ysočina	71	*13,4*	247	*46,8*	5	*0,9*	**178**	***33,7***	16	*3,0*	11	*2,1*	**528**	29	*11,6*	146	*58,2*	0	*0,0*	**70**	***27,9***	2	*0,8*	4	*1,6*	**251**
homoravský	185	*13,7*	312	*23,1*	52	*3,8*	**642**	***47,5***	15	*1,1*	147	*10,9*	**1353**	60	*8,9*	229	*33,8*	7	*1,0*	**252**	***37,2***	9	*1,3*	120	*17,7*	**677**
lomoucký	80	*12,0*	131	*19,7*	21	*3,2*	**402**	***60,5***	10	*1,5*	21	*3,2*	**665**	31	*9,9*	81	*25,8*	5	*1,6*	**176**	***56,1***	4	*1,3*	17	*5,4*	**314**
línský	80	*14,3*	183	*32,7*	5	*0,9*	**255**	***45,6***	18	*3,2*	18	*3,2*	**559**	35	*12,5*	106	*38,0*	1	*0,4*	**117**	***41,9***	14	*5,0*	6	*2,2*	**279**
loravskoslezský	86	*11,0*	197	*25,3*	27	*3,5*	**372**	***47,7***	41	*5,3*	57	*7,3*	**780**	48	*10,7*	160	*35,6*	11	*2,4*	**179**	***39,8***	28	*6,2*	24	*5,3*	**450**
R	**1364**	***14,8***	**2134**	***23,1***	**252**	***2,7***	**4657**	***50,4***	**286**	***3,1***	**544**	***5,9***	**9237**	**591**	***12,5***	**1548**	***32,8***	**73**	***1,5***	**2016**	***42,7***	**159**	***3,4***	**332**	***7,0***	**4719**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 10

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Nejvyšší dokončené vzdělání uživatelů drog žádajících o léčbu

Nejvyšší dokončené vzdělání (N případů)	Všichni klienti v roce 2002				První léčení v roce 2002 (FTD)			
	Muži	Ženy	Neznámo	Celkem	Muži	Ženy	Neznámo	Celkem
1. Nedokončené základní	283	144	6	**433**	209	107	2	**318**
2. Základní	2804	1536	16	**4356**	1413	853	11	**2277**
3. Střední bez maturity	1816	519	9	**2344**	837	252	3	**1092**
4. Střední s maturitou	605	430	7	**1042**	277	163	6	**446**
5. Vyšší – VOŠ	13	8	0	**21**	4	3	0	**7**
6. Vysokoškolské	28	3	0	**31**	7	1	0	**8**
0. Neznámo	753	255	2	**1010**	426	145	0	**571**
Celkem	**6302**	**2895**	**40**	**9237**	**3173**	**1524**	**22**	**4719**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Tab. č. 11

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Incidence, prevalence, specifická věková incidence a prevalence na 100 000 obyvatel v ČR a podle krajů

Kraj	Všichni klienti				Z toho ve věkové skupině 15-39 let			
	Incidence (FTD)		Prevalence		Incidence (FTD)		Prevalence	
	Počet	/ incidence na 100 000 obyvatel	Počet	/ prevalence na 100 000 obyvatel	Počet	/ incidence na 100 000 obyvatel	Počet	/ prevalence na 100 000 obyvatel
Praha	572	***48,3***	1328	***112,2***	529	***127,5***	1251	***301,4***
Středočeský	441	***39,6***	758	***68,1***	423	***105,2***	727	***180,8***
Jihočeský	239	***38,2***	512	***81,8***	216	***93,5***	470	***203,5***
Plzeňský	215	***38,9***	311	***56,4***	200	***100,1***	280	***140,2***
Karlovarský	98	***32,2***	169	***55,5***	92	***80,4***	160	***139,8***
Ústecký	741	***89,6***	1640	***198,3***	714	***229,5***	1589	***510,7***
Liberecký	169	***39,4***	259	***60,4***	152	***95,4***	236	***148,1***
Královéhradecký	148	***26,8***	209	***37,9***	148	***74,4***	207	***104,1***
Pardubický	125	***24,6***	166	***32,6***	122	***65,4***	163	***87,4***
Vysočina	251	***48,2***	528	***101,3***	225	***115,7***	485	***249,4***
Jihomoravský	677	***59,5***	1353	***119,0***	664	***158,8***	1301	***310,7***
Olomoucký	314	***48,9***	665	***103,6***	301	***125,8***	630	***263,3***
Zlínský	279	***46,7***	559	***93,5***	266	***118,5***	542	***241,5***
Moravskoslezský	450	***35,2***	780	***60,9***	408	***84,6***	719	***149,1***
Česká republika	**4719**	***45,9***	**9237**	***89,9***	**4460**	***118,1***	**8760**	***231,9***

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 12

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Základní droga podle pohlaví - skupiny drog

Skupiny základních drog	Všichni klienti v roce 2002						První léčení v roce 2002 (FTD)					
	Muži		Ženy		Celkem osob	% ze všech	Muži		Ženy		Celkem osob	% z FTD
	Počet	%	Počet	%			Počet	%	Počet	%		
Opiáty – celkem	**1600**	68,0	**741**	31,5	**2353*)**	***25,5***	547	*69,4*	239	*30,3*	**788°)**	***16,0***
Heroin	1399	*67,9*	651	*31,6*	**2060*)**	***22,3***	470	*69,6*	203	*30,1*	**675°)**	***14,3***
Morfin	6	*66,7*	3	*33,3*	**9**	***0,1***	2	*50,0*	2	*50,0*	**4**	***0,1***
Kodein	26	*78,8*	6	*18,2*	**33*)**	***0,4***	9	*69,2*	4	*30,8*	**13**	***0,3***
Brown	14	*58,3*	10	*41,7*	**24**	***0,3***	6	*60,0*	4	*40,0*	**10**	***0,2***
Metadon	91	*66,9*	44	*32,4*	**136*)**	***1,5***	27	*73,0*	10	*27,0*	**37**	***0,8***
Ostatní opiáty	64	*70,3*	27	*29,7*	**91**	***1,0***	33	*67,3*	16	*0*	**49**	***1,0***
Kokain – celkem	**10**	***76,9***	**3**	***23,1***	**13**	***0,1***	3	*100*	0	*0*	**3**	***0,1***
Kokain	9	*75,0*	3	*25,0*	**12**	***0,1***	3	*100*	0	*0*	**3**	***0,1***
Crack	1	*100*	0	*0*	**1**	***0***	*	*	*	*	*	*
Stimulancia - celkem	**3191**	***66,1***	**1626**	***33,7***	**4831*)**	***52,3***	1651	*63,6*	933	*36,0*	**2595°)**	***55,0***
Amfetamin	7	*70,0*	3	*30,0*	**10**	***0,1***	5	*83,3*	1	*16,7*	**6**	***0,1***
Pervitin	3035	*66,1*	1544	*33,6*	**4589*)**	***49,7***	1515	*63,4*	867	*36,3*	**2389°)**	***50,6***
Extáze (MDMA)	139	*63,8*	75	*34,4*	**218*)**	***2,4***	126	*65,3*	63	*32,6*	**193°)**	***4,1***
Fenmetrazin	7	*100*	0	*0*	**7**	***0,1***	2	*100*	0	*0*	**2**	***0,0***
Efedrin	3	*42,9*	4	*57,1*	**7**	***0,1***	3	*60,0*	2	*40,0*	**5**	***0,1***
Hypnotika, sedativa	**58**	***50,9***	**56**	***49,1***	**114**	***1,2***	17	*41,5*	24	*58,5*	**41**	***0,9***
Barbituráty	10	*71,4*	4	*28,6*	**14**	***0,2***	5	*55,6*	4	*44,4*	**9**	***0,2***
Benzodiazepiny	20	*41,7*	28	*58,3*	**48**	***0,5***	6	*35,3*	11	*64,7*	**17**	***0,4***
Ostatní sedativa	28	*53,8*	24	*46,2*	**52**	***0,6***	6	*40,0*	9	*60,0*	**15**	***0,3***
Halucinogeny – celkem	**41**	***87,2***	**6**	***12,8***	**47**	***0,5***	17	*85,0*	3	*15,0*	**20**	***0,4***
LSD	30	*88,2*	4	*11,8*	**34**	***0,4***	11	*84,6*	2	*15,4*	**13**	***0,3***
Psilocybin	10	*83,3*	2	*16,7*	**12**	***0,1***	6	*85,7*	1	*14,3*	**7**	***0,1***
Durman	1	*100*	0	*0*	**1**	***0***	*	*	*	*	*	*
Rozpustidla - celkem	**283**	***85,2***	**48**	***14,5***	**332*)**	***3,6***	147	*86,0*	24	*14,0*	**171**	***3,6***
Toluen	249	*86,2*	39	*13,5*	**289*)**	***3,1***	128	*85,9*	21	*14,1*	**149**	***3,2***
Jiná rozpustidla	34	*79,1*	9	*20,9*	**43**	***0,5***	19	*86,4*	3	*13,6*	**22**	***0,5***
Kanabinoidy – celkem	**1077**	***72,3***	**400**	***26,9***	**1489*)**	***16,1***	769	*71,9*	292	*27,3*	**1070°)**	***22,7***
Marihuana	1076	*72,4*	398	*26,8*	**1486*)**	***16,1***	769	*72,0*	290	*27,2*	**1068°)**	***22,6***
Hašiš	1	*33,3*	2	*66,7*	**3**	***0***	0	*0*	2	*100*	**2**	***0,0***
Jiné drogy, léky	**33**	***73,3***	**12**	***26,7***	**45**	***0,5***	18	*72,0*	7	*28,0*	**25**	***0,5***
Neznámá	**9**	***69,2***	**3**	***23,1***	**13*)**	***0,1***	4	*66,7*	2	*33,3*	**6**	***0,1***
Celkem	**6302**	***68,2***	**2895**	***31,3***	**9237*)**	***100***	3173	*67,2*	1524	*32,3*	**4719°)**	***100,0***
Gambling	314	*96,6*	11	*3,4*	**325**	***3,4**)***	209	*96,8*	7	*3,2*	**216**	***4,6°°)***

***)** u 10 uživatelů heroinu, 1 uživatele kodeinu, 1 uživatele metadonu nesubst., 10 uživatelů pervitinu, 4 uživatelů extáze, 1 uživatele toluenu, 12 uživatelů marihuany a 1 uživatele neznámé drogy není známo pohlaví.

°) u 2 uživatelů heroinu, 7 uživatelů pervitinu, 4 uživatelů extáze a 9 uživatelů marihuany není známo pohlaví.

****)** procento z celkového počtu všech uživatelů drog - žadatelů o léčbu včetně gamblingu (= 9562 osob)

°°) procento z celkového počtu nově evidovaných uživatelů drog - žadatelů o léčbu včetně gamblingu (= 4935 osob)

Pozn.: substitučně užívá metadon 77 mužů a 36 žen, u 1 klienta není známo pohlaví, jiným způsobem 14 mužů a 8 žen

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 13

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Základní droga podle skupin drog a krajů - nově evidovaní klienti v roce 2002 (First Treatment Demand – FTD)

Kraj		Skupiny základní drogy									
		Heroin, ost. opiáty	Pervitin, ost. stimulancia	Kanabinoidy	Halucinogeny	Rozpustidla	Sedativa, hypnotika	Jiné drogy, léky	Neznámá	Celkem uživatelů	Gambling
Praha	Počet	221	241	94	*	4	4	2	6	**572**	*
	%	*38,6*	*42,1*	*16,4*	*	*0,7*	*0,7*	*0,3*	*1,0*	***100***	*
Středočeský	Počet	77	155	192	1	10	4	2	*	**441**	8
	%	*17,5*	*35,1*	*43,5*	*0,2*	*2,3*	*0,9*	*0,5*	*	***100***	*1,8*
Jihočeský	Počet	56	134	35	1	3	6	4	*	**239**	2
	%	*23,4*	*56,1*	*14,6*	*0,4*	*1,3*	*2,5*	*1,7*	*	***100***	*0,8*
Plzeňský	Počet	31	134	37	*	7	6	*	*	**215**	14
	%	*14,4*	*62,3*	*17,2*	*	*3,3*	*2,8*	*	*	***100***	*6,1*
Karlovarský	Počet	20	42	29	*	6	*	1	*	**98**	2
	%	*20,4*	*42,9*	*29,6*	*	*6,1*	*	*1,0*	*	***100***	*2,0*
Ústecký	Počet	193	443	73	1	29	2	*	*	**741**	12
	%	*26,0*	*59,8*	*9,9*	*0,1*	*3,9*	*0,3*	*	*	***100***	*1,6*
Liberecký	Počet	7	90	63	1	6	2	*	*	**169**	1
	%	*4,1*	*53,3*	*37,3*	*0,6*	*3,6*	*1,2*	*	*	***100***	*0,6*
Královéhradecký	Počet	16	105	24	2	1	*	*	*	**148**	17
	%	*10,8*	*70,9*	*16,2*	*1,4*	*0,7*	*	*	*	***100***	*10,3*
Pardubický	Počet	7	100	14	*	1	2	1	*	**125**	*
	%	*5,6*	*80,0*	*11,2*	*	*0,8*	*1,6*	*0,8*	*	***100***	*
Vysočina	Počet	10	86	136	3	15	1	*	*	**251**	19
	%	*4,0*	*34,3*	*54,2*	*1,2*	*6,0*	*0,4*	*	*	***100***	*7,0*
Jihomoravský	Počet	61	500	104	1	9	2	*	*	**677**	8
	%	*9,0*	*73,9*	*15,4*	*0,1*	*1,3*	*0,3*	*	*	***100***	*1,2*
Olomoucký	Počet	35	187	63	4	14	5	6	*	**314**	5
	%	*11,1*	*59,6*	*20,1*	*1,3*	*4,5*	*1,6*	*1,9*	*	***100***	*1,6*
Zlínský	Počet	10	169	72	3	24	*	1	*	**279**	22
	%	*3,6*	*60,6*	*25,8*	*1,1*	*8,6*	*	*0,4*	*	***100***	*7,3*
Moravskoslezský	Počet	44	212	134	3	42	7	8	*	**450**	106
	%	*9,8*	*47,1*	*29,8*	*0,7*	*9,3*	*1,6*	*1,8*	*	***100***	*19,1*
Česká republika	**Počet**	**788**	**2598**	**1070**	**20**	**171**	**41**	**25**	**6**	**4719**	**216**
	%	***16,7***	***55,1***	***22,7***	***0,4***	***3,6***	***0,9***	***0,5***	***0,1***	***100***	***4,4***

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 14

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Základní droga podle skupin drog a krajů – všichni klienti v roce 2002

Kraj		Skupiny základní drogy									
		Heroin, ost. opiáty	Pervitin, ost. stimulancia	Kanabinoidy	Halucinogeny	Rozpustidla	Sedativa, hypnotika	Jiné drogy, léky	Neznámá	Celkem uživatelů	Gambling
Praha	Počet	711	463	118	3	9	8	4	12	**1328**	1
	%	*53,5*	*34,9*	*8,9*	*0,2*	*0,7*	*0,6*	*0,3*	*0,9*	***100***	*0,1*
Středočeský	Počet	198	258	254	2	23	19	4	*	**758**	11
	%	*26,1*	*34,0*	*33,5*	*0,3*	*3,0*	*2,5*	*0,5*	*	***100***	*1,4*
Jihočeský	Počet	164	266	61	1	7	8	5	*	**512**	2
	%	*32,0*	*52,0*	*11,9*	*0,2*	*1,4*	*1,6*	*1,0*	*	***100***	*0,4*
Plzeňský	Počet	45	190	47	1	14	14	*	*	**311**	14
	%	*14,5*	*61,1*	*15,1*	*0,3*	*4,5*	*4,5*	*	*	***100***	*4,3*
Karlovarský	Počet	25	95	37	*	11	*	1	*	**169**	2
	%	*14,8*	*56,2*	*21,9*	*	*6,5*	*	*0,6*	*	***100***	*1,2*
Ústecký	Počet	609	863	102	3	56	5	2	*	**1640**	16
	%	*37,1*	*52,6*	*6,2*	*0,2*	*3,4*	*0,3*	*0,1*	*	***100***	*1,0*
Liberecký	Počet	35	135	70	1	12	5	1	*	**259**	1
	%	*13,5*	*52,1*	*27,0*	*0,4*	*4,6*	*1,9*	*0,4*	*	***100***	*0,4*
Královéhradecký	Počet	45	129	27	2	1	5	*	*	**209**	22
	%	*21,5*	*61,7*	*12,9*	*1,0*	*0,5*	*2,4*	*	*	***100***	*9,5*
Pardubický	Počet	12	129	19	1	1	2	1	1	**166**	*
	%	*7,2*	*77,7*	*11,4*	*0,6*	*0,6*	*1,2*	*0,6*	*0,6*	***100***	*
Vysočina	Počet	60	201	238	6	22	1	*	*	**528**	33
	%	*11,4*	*38,1*	*45,1*	*1,1*	*4,2*	*0,2*	*	*	***100***	*5,9*
Jihomoravský	Počet	175	983	134	5	30	26	*	*	**1353**	23
	%	*12,9*	*72,7*	*9,9*	*0,4*	*2,2*	*1,9*	*	*	***100***	*1,7*
Olomoucký	Počet	115	384	101	9	36	8	12	*	**665**	9
	%	*17,3*	*57,7*	*15,2*	*1,4*	*5,4*	*1,2*	*1,8*	*	***100***	*1,3*
Zlínský	Počet	24	382	108	6	38	*	1	*	**559**	32
	%	*4,3*	*68,3*	*19,3*	*1,1*	*6,8*	*	*0,2*	*	***100***	*5,4*
Moravskoslezský	Počet	135	366	173	7	72	13	14	*	**780**	159
	%	*17,3*	*46,9*	*22,2*	*0,9*	*9,2*	*1,7*	*1,8*	*	***100***	*16,9*
Česká republika	Počet	**2353**	**4844**	**1489**	**47**	**332**	**114**	**45**	**13**	**9237**	**325**
	%	***25,5***	***52,4***	***16,1***	***0,5***	***3,6***	***1,2***	***0,5***	***0,1***	***100***	***3,4***

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE

Tab. č. 15

uživatelů drog - žadatelů o léčbu

ČR - 2002

Věkové skupiny uživatelů drog - žadatelů o léčbu podle pohlaví

Věkové skupiny (N případů)	Všichni klienti v roce 2002				První léčba v roce 2002 (FTD)			
	Muži	Ženy	Neznámo	Celkem	Muži	Ženy	Neznámo	Celkem
do 15 let	77	44	*	**121**	69	39	*	**108**
15 – 19 let	1516	1124	12	**2652**	1111	772	9	**1892**
20 – 24 let	2303	1113	11	**3427**	1093	480	6	**1579**
25 – 29 let	1296	353	5	**1654**	525	118	2	**645**
30 – 34 let	539	117	*	**656**	189	54	*	**243**
35 – 39 let	303	66	2	**371**	79	22	*	**101**
40 – 44 let	111	11	*	**122**	43	6	*	**49**
45 – 49 let	48	13	*	**61**	9	7	*	**16**
50 – 54 let	17	7	*	**24**	9	2	*	**11**
55 – 59 let	15	9	*	**24**	6	4	*	**10**
60 – 64 let	5	6	*	**11**	3	2	*	**5**
65 a víc let	2	2	*	**4**	*	*	*	*
Neznámo	70	30	10	**110**	37	18	5	**60**
Celkem	**6302**	**2895**	**40**	**9237**	**3137**	**1524**	**22**	**4719**
Průměrný věk	***24,1***	***21,8***	***22,0***	***23,4***	***22,4***	***20,5***	*19,9*	***21,8***

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002 Základní drogy a skupiny drog podle věkových skupin - muži

Tab. č. 16

	Všichni klienti v roce 2002														První léčba v roce 2002 (FTD)													
	do 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 +	nezn.	celk.	do 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 +	nezn.	celk.
Opiáty	**1**	**156**	**718**	**454**	**121**	**83**	**35**	**10**	**5**	**2**	**2**	**1**	**12**	**1600**	**1**	**82**	**241**	**140**	**37**	**19**	**15**	**3**	**2**	**1**	**1**	**0**	**5**	**547**
Heroin	1	141	654	406	98	56	23	5	3	0	0	0	12	**1399**	1	74	220	120	29	12	7	1	1	0	0	0	5	**470**
Morfin	0	2	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	**6**	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**2**
Kodein	0	0	4	2	5	9	3	1	2	0	0	0	0	**26**	0	0	1	1	1	4	1	0	1	0	0	0	0	**9**
Brown	0	0	4	2	1	6	0	1	0	0	0	0	0	**14**	0	0	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	**6**
Metadon	0	3	32	32	12	8	3	0	0	0	1	0	0	**91**	0	0	8	9	5	1	3	0	0	0	1	0	0	**27**
Ostatní opiáty	0	10	22	12	5	3	6	2	0	2	1	1	0	**64**	0	7	10	10	1	0	4	0	0	1	0	0	0	**33**
Kokain – celkem	**0**	**2**	**3**	**1**	**3**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**
Kokain	0	1	3	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	**9**	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
Crack	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stimulancia	**6**	**665**	**1166**	**698**	**337**	**186**	**54**	**26**	**6**	**4**	**1**	**1**	**41**	**3191**	**5**	**474**	**624**	**317**	**122**	**50**	**23**	**5**	**3**	**3**	**0**	**0**	**25**	**1651**
Amfetamin	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
Pervitin	6	609	1089	685	332	184	53	25	5	4	1	1	41	**3035**	5	421	557	307	118	50	23	4	2	3	0	0	25	**1515**
Extáze (MDMA)	0	53	70	9	5	0	1	1	0	0	0	0	0	**139**	0	51	61	9	4	0	0	1	0	0	0	0	0	**126**
Efedrin,	0	1	4	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	**10**	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**5**
Hypnotika, sedativa	**0**	**1**	**7**	**5**	**6**	**8**	**11**	**10**	**4**	**4**	**1**	**0**	**1**	**58**	**0**	**0**	**3**	**2**	**3**	**2**	**2**	**1**	**3**	**0**	**1**	**0**	**0**	**17**
Benzodiazepiny	0	0	4	3	1	1	2	4	3	2	0	0	0	**20**	0	0	1	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	**6**
Ostatní sedativa	0	1	3	2	5	7	9	6	1	2	1	0	1	**38**	0	0	2	0	2	2	2	1	1	0	1	0	0	**11**
Halucinogeny	**1**	**7**	**19**	**12**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41**	**1**	**6**	**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**
LSD	1	3	13	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**30**	1	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
Psilocybin	0	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
Durman	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Rozpustidla	**15**	**120**	**80**	**29**	**23**	**7**	**2**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**4**	**283**	**15**	**87**	**26**	**9**	**7**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**147**
Toluen	14	97	74	27	23	5	2	1	1	1	0	0	4	**249**	14	71	24	9	7	1	0	0	0	0	0	0	2	**128**
Jiná rozpustidla	1	23	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	**34**	1	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
Kanabinoidy celkem	**53**	**559**	**304**	**88**	**40**	**13**	**6**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**12**	**1077**	**46**	**456**	**188**	**47**	**18**	**5**	**3**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**5**	**769**
Marihuana	53	559	304	87	40	13	6	1	1	0	0	0	12	**1076**	46	456	188	47	18	5	3	0	1	0	0	0	5	**769**
Hašiš	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Jiné drogy, léky	**1**	**5**	**5**	**4**	**6**	**5**	**2**	**0**	**0**	**4**	**1**	**0**	**0**	**33**	**1**	**4**	**5**	**2**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**18**
Neznámá	**0**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**0**	**1**	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**
Celkem	**77**	**1516**	**2303**	**1296**	**539**	**303**	**111**	**48**	**17**	**15**	**5**	**2**	**70**	**6302**	**69**	**1111**	**1093**	**525**	**189**	**79**	**43**	**9**	**9**	**6**	**3**	**0**	**37**	**3173**
Gambling	1	17	74	86	33	42	22	16	14	7	1	1	0	**314**	1	15	56	51	24	25	15	7	8	6	0	1	0	**209**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Tab. č. 17

Základní drogy a skupiny drog podle věkových skupin - ženy

	Všichni klienti v roce 2002														První léčba v roce 2002 (FTD)												
	do 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 +	nezn.	celk.	do 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 +	nezn.	celk.
Opiáty	**0**	**142**	**378**	**143**	**41**	**21**	**4**	**2**	**0**	**4**	**1**	**1**	**4**	**741**	**0**	**62**	**109**	**35**	**19**	**5**	**2**	**2**	**0**	**4**	**0**	**0**	**1**	**239**
Heroin	0	131	351	118	31	15	1	0	0	0	0	0	4	**651**	0	58	99	28	12	5	0	0	0	0	0	0	1	**203**
Morfin	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	**3**	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	**2**
Kodein	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	1	0	0	**6**	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	**4**
Brown	0	3	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	**10**	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
Metadon	0	0	22	16	3	3	0	0	0	0	0	0	0	**44**	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
Ostatní opiáty	0	7	5	4	5	0	3	1	0	1	0	1	0	**27**	0	3	2	3	4	0	2	1	0	1	0	0	0	**16**
Kokain – celkem	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kokain	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Crack	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stimulancia	**8**	**676**	**628**	**193**	**64**	**33**	**0**	**4**	**1**	**1**	**0**	**0**	**18**	**1626**	**6**	**487**	**312**	**75**	**28**	**13**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**933**
Amfetamin	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Pervitin	8	635	595	188	63	33	0	4	1	1	0	0	16	**1544**	6	453	285	71	28	13	0	2	0	0	0	0	9	**867**
Extáze (MDMA)	0	39	30	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**75**	0	32	27	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**63**
Efedrin	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	**4**	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**2**
Hypnotika, sedativa	**0**	**5**	**3**	**7**	**6**	**9**	**5**	**6**	**5**	**4**	**4**	**1**	**1**	**56**	**0**	**4**	**1**	**5**	**2**	**1**	**3**	**3**	**2**	**0**	**2**	**0**	**1**	**24**
Benzodiazepiny	0	4	2	2	2	4	2	4	5	0	2	1	0	**28**	0	3	0	1	0	0	1	3	2	0	1	0	0	**11**
Ostatní sedativa	0	1	1	5	4	5	3	2	0	4	2	0	1	**28**	0	1	1	4	2	1	2	0	0	0	1	0	1	**13**
Halucinogeny	**0**	**4**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**
LSD	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Psilocybin	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Durman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Rozpustidla	**7**	**30**	**7**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48**	**6**	**17**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**
Toluen	6	23	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**39**	6	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21**
Jiná rozpustidla	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
Kanabinoidy	**29**	**263**	**90**	**4**	**5**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**400**	**27**	**198**	**53**	**2**	**4**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**292**
Marihuana	29	263	88	4	5	1	1	0	0	0	0	0	7	**398**	27	198	51	2	4	1	1	0	0	0	0	0	6	**290**
Hašiš	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Jiné drogy, léky	**0**	**2**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**12**	**0**	**2**	**2**	**0**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**
Neznámá	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
Celkem	**44**	**1124**	**1113**	**353**	**117**	**66**	**11**	**13**	**7**	**9**	**6**	**2**	**30**	**2895**	**39**	**772**	**480**	**118**	**54**	**22**	**6**	**7**	**2**	**4**	**2**	**0**	**18**	**1524**
Gambling	0	0	2	1	1	5	0	0	1	1	0	0	0	**11**	0	0	2	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	**7**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Tab. č. 18

Základní drogy a skupiny drog podle věkových skupin – celkem

	Všichni klienti v roce 2002														První léčba v roce 2002 (FTD)												
	do 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 +	nezn.	celk.	do 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 +	nezn.	celk.
Opiáty	**1**	**299**	**1102**	**598**	**162**	**105**	**39**	**12**	**5**	**6**	**3**	**2**	**19**	**2353**	**1**	**144**	**351**	**175**	**56**	**24**	**17**	**5**	**2**	**5**	**1**	**0**	**7**	**788**
Heroin	1	273	1010	525	129	71	24	5	3	0	0	0	19	**2060**	1	132	320	148	41	17	7	1	1	0	0	0	7	**675**
Morfin	0	3	2	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	**9**	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	**4**
Kodein	0	0	5	3	7	9	3	1	2	2	1	0	0	**33**	0	0	1	1	3	4	1	0	1	2	0	0	0	**13**
Brown	0	3	4	6	1	9	0	1	0	0	0	0	0	**24**	0	1	2	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	**10**
Metadon	0	3	54	48	15	12	3	0	0	0	1	0	0	**136**	0	0	16	10	6	1	3	0	0	0	1	0	0	**37**
Ostatní opiáty	0	17	27	16	10	3	9	3	0	3	1	2	0	**91**	0	10	12	13	5	0	6	1	0	2	0	0	0	**49**
Kokain – celkem	**0**	**4**	**4**	**1**	**3**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**
Kokain	0	3	4	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	**12**	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
Crack	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stimulancia	**14**	**1344**	**1799**	**893**	**401**	**219**	**54**	**30**	**7**	**5**	**1**	**1**	**63**	**4831**	**11**	**963**	**941**	**393**	**150**	**63**	**23**	**7**	**3**	**3**	**0**	**0**	**38**	**2595**
Amfetamin	0	3	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
Pervitin	14	1246	1687	874	395	217	53	29	6	5	1	1	61	**4589**	11	875	845	378	146	63	23	6	2	3	0	0	37	**2389**
Extáze (MDMA)	0	93	102	15	5	0	1	1	0	0	0	0	1	**218**	0	84	90	14	4	0	0	1	0	0	0	0	0	**193**
Efedrin, fenmetrazin	0	2	5	2	1	2	0	0	1	0	0	0	1	**14**	0	1	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	**7**
Hypnotika, sedativa	**0**	**6**	**10**	**12**	**12**	**17**	**16**	**16**	**9**	**8**	**5**	**1**	**2**	**114**	**0**	**4**	**4**	**7**	**5**	**3**	**5**	**4**	**5**	**0**	**3**	**0**	**1**	**41**
Benzodiazepiny	0	4	6	5	3	5	4	8	8	2	2	1	0	**48**	0	3	1	3	1	0	1	3	4	0	1	0	0	**17**
Ostatní sedativa	0	2	4	7	9	12	12	8	1	6	3	0	2	**66**	0	1	3	4	4	3	4	1	1	0	2	0	1	**24**
Halucinogeny	**1**	**11**	**21**	**12**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47**	**1**	**8**	**6**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**
LSD	1	5	15	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**34**	1	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
Psilocybin	0	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
Durman	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Rozpustidla	**22**	**150**	**87**	**33**	**23**	**7**	**2**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**5**	**332**	**21**	**104**	**27**	**9**	**7**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**171**
Toluen	20	120	80	31	23	5	2	1	1	1	0	0	5	**289**	20	85	25	9	7	1	0	0	0	0	0	0	2	**149**
Jiná rozpustidla	2	30	7	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	**43**	1	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
Kanabinoidy celkem	**82**	**830**	**395**	**93**	**45**	**14**	**7**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**21**	**1489**	**73**	**661**	**241**	**50**	**22**	**6**	**4**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**12**	**1070**
Marihuana	82	830	393	92	45	14	7	1	1	0	0	0	21	**1486**	73	661	239	50	22	6	4	0	1	0	0	0	12	**1068**
Hašiš	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Jiné drogy, léky	**1**	**7**	**7**	**5**	**7**	**7**	**3**	**1**	**1**	**4**	**2**	**0**	**0**	**45**	**1**	**6**	**7**	**2**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**25**
Neznámá	**0**	**1**	**3**	**6**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**1**	**1**	**3**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**
Celkem	**121**	**2652**	**3428**	**1653**	**656**	**371**	**122**	**61**	**24**	**24**	**11**	**4**	**110**	**9237**	**108**	**1892**	**1579**	**645**	**243**	**101**	**49**	**16**	**11**	**10**	**5**	**0**	**60**	**4719**
Gambling	1	17	76	87	34	47	22	16	15	8	1	1	0	**325**	1	15	58	52	25	28	15	7	8	6	0	1	0	**216**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Tab. č. 19

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Věková distribuce uživatelů drog - žadatelů o léčbu – incidence v roce 2002

a) Všichni léčení uživatelé

Věková skupina	Muži	Ženy	Poměr mužů a žen	Celkem	Procento	Incidence na 100 000 obyvatel
do 15	69	39	1,8 : 1	**108**	*2,3*	**6,4**
15 - 19	1111	772	1,4 : 1	**1892*)**	*40,1*	**273,9**
20 - 24	1093	480	2,3 : 1	**1579*)**	*33,5*	**181,4**
25 - 39	793	194	4,1 : 1	**989*)**	*21,0*	**44,6**
40 a více	70	21	3,3 : 1	**91**	*1,9*	**1,9**
Neznámá	37	18	2,1 : 1	**60*)**	*1,3*	*
Celkem	**3173**	**1524**	**2,1 : 1**	**4719*)**	***100***	**45,9**

*) U 22 léčených uživatelů drog není známo pohlaví.
Pozn.: Nejsou započteni gambleři

b) Léčení uživatelé heroinu

Věková skupina	Muži	Ženy	Poměr mužů a žen	Celkem	Procento	Incidence na 100 000 obyvatel
do 15	1	0	1,0 : 0	**1**	*0,1*	**0,1**
15 - 19	74	58	1,3 : 1	**132**	*19,6*	**19,1**
20 - 24	220	99	2,2 : 1	**320*)**	*47,4*	**36,7**
25 - 39	161	45	3,6 : 1	**206**	*30,5*	**9,3**
40 a více	9	0	9,0 : 0	**9**	*1,3*	**0,2**
Neznámá	5	1	5,0 : 1	**7*)**	*1,0*	*
Celkem	**470**	**203**	**2,3 : 1**	**675*)**	***100***	**6,6**

*) U 2 léčených uživatelů heroinu není známo pohlaví.

c) Léčení uživatelé pervitinu

Věková skupina	Muži	Ženy	Poměr mužů a žen	Celkem	Procento	Incidence na 100 000 obyvatel
do 15	5	6	0,8 : 1	**11**	*0,5*	**0,7**
15 - 19	421	453	0,9 : 1	**875*)**	*36,6*	**126,7**
20 - 24	557	285	2,0 : 1	**845*)**	*35,4*	**97,0**
25 - 39	475	112	4,2 : 1	**587**	*24,6*	**26,5**
40 a více	32	2	16,0 : 1	**34**	*1,4*	**0,7**
Neznámá	25	9	2,8 : 1	**37*)**	*1,5*	*
Celkem	**1515**	**867**	**1,7 : 1**	**2389*)**	***100***	**23,3**

*) U 7 léčených uživatelů pervitinu není známo pohlaví.

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 20

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Věková distribuce uživatelů drog - žadatelů o léčbu – prevalence v roce 2002

a) Všichni léčení uživatelé

Věková skupina	Muži	Ženy	Poměr mužů a žen	Celkem	Procento	Prevalence na 100 000 obyvatel
do 15	77	44	1,7 : 1	**121**	*1,3*	**7,2**
15 - 19	1516	1124	1,3 : 1	**2652*)**	*28,7*	**384,0**
20 - 24	2303	1113	2,1 : 1	**3427*)**	*37,1*	**393,5**
25 - 39	2138	536	4,0 : 1	**2681*)**	*29,0*	**121,0**
40 a více	198	48	4,1 : 1	**246**	*2,7*	**5,1**
Neznámá	70	30	2,3 : 1	**110*)**	*1,2*	*
Celkem	**6302**	**2895**	**2,1 : 1**	**9237*)**	***100***	**89,9**

*) U 40 léčených uživatelů drog není známo pohlaví.
Pozn.: Nejsou započteni gambleři

b) Léčení uživatelé heroinu

Věková skupina	Muži	Ženy	Poměr mužů a žen	Celkem	Procento	Prevalence na 100 000 obyvatel
do 15	1	0	1,0 : 0	**1**	*0,0*	**0,1**
15 - 19	141	131	1,1 : 1	**273*)**	*13,3*	**39,5**
20 - 24	654	351	1,9 : 1	**1010*)**	*49,0*	**116,0**
25 - 39	560	164	3,4 : 1	**725*)**	*35,2*	**32,7**
40 a více	31	1	3,1 : 1	**32**	*1,6*	**0,7**
Neznámá	12	4	3,0 : 1	**19*)**	*0,9*	*
Celkem	**1399**	**651**	**2,1 : 1**	**2060*)**	***100***	**20,1**

*) U 10 léčených uživatelů heroinu není známo pohlaví.

c) Léčení uživatelé pervitinu

Věková skupina	Muži	Ženy	Poměr mužů a žen	Celkem	Procento	Prevalence na 100 000 obyvatel
do 15	6	8	0,7 : 1	**14**	*0,3*	**0,8**
15 - 19	609	635	0,9 : 1	**1246*)**	*27,1*	**180,4**
20 - 24	1089	595	1,8 : 1	**1687*)**	*36,8*	**193,7**
25 - 39	1201	284	4,2 : 1	**1486*)**	*32,4*	**67,1**
40 a více	89	6	14,8 : 1	**95**	*2,1*	**1,9**
Neznámá	41	16	2,6 : 1	**61*)**	*1,3*	*
Celkem	**3035**	**1544**	**1,9 : 1**	**4589*)**	***100***	**44,7**

*) U 10 léčených uživatelů pervitinu není známo pohlaví.

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 21

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE
uživatelů drog - žadatelů o léčbu
ČR - 2002
Průměrný věk uživatelů drog - žadatelů o léčbu
podle skupin základní drogy a pohlaví

Skupina drog	Všichni klienti v roce 2002			První léčba v roce 2002 (FTD)		
	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem
Opiáty	***25,3***	***23,6***	*24,8*	***24,6***	***23,6***	***24,3***
Heroin	*24,8*	*22,9*	*24,2*	*23,9*	*22,3*	*23,4*
Metadon	*27,4*	*25,7*	*26,9*	*29,7*	*23,8*	*28,1*
Ostatní opiáty	*30,6*	*31,5*	*30,8*	*29,0*	*33,6*	*30,5*
Kokain – celkem	***26,9***	***31,5***	*25,2*	***21,7***	*	***21,7***
Kokain	*27,8*	*19,7*	*25,8*	*21,7*	*	*21,7*
Crack	*19,0*	*	*19,0*	*	*	*
Stimulancia	***24,7***	***21,3***	*235*	***23,2***	***20,3***	***22,2***
Pervitin	*24,8*	*21,4*	*23,7*	*23,4*	*20,4*	*22,3*
Extáze (MDMA)	*21,3*	*19,7*	*20,8*	*21,1*	*19,7*	*20,6*
Ostatní stimulancia	*25,8*	*21,7*	*24,7*	*24,6*	*16,0*	*23,2*
Hypnotika, sedativa	***38,9***	***39,3***	*39,1*	***37,5***	***35,7***	***36,5***
Benzodiazepiny	*39,1*	*39,8*	*39,5*	*35,2*	*39,0*	*37,6*
Ostatní sedativa	*38,8*	*38,7*	*38,8*	*38,7*	*32,7*	*35,6*
Halucinogeny	***22,5***	***19,0***	*22,1*	***21,0***	***18,3***	***20,6***
LSD	*23,5*	*20,3*	*23,1*	*22,5*	*19,5*	*22,1*
Psilocybin	*19,7*	*16,5*	*19,2*	*18,2*	*16,0*	*17,9*
Durman	*21,0*	*	*21,0*	*	*	*
Rozpustidla	***21,6***	***17,7***	*21,1*	***18,9***	***15,5***	***18,4***
Toluen	*21,9*	*17,7*	*21,3*	*19,2*	*15,6*	*18,6*
Jiná rozpustidla	*19,6*	*17,6*	*19,2*	*17,1*	*15,0*	*16,8*
Kanabinoidy celkem	***20,0***	***18,0***	*19,4*	***19,1***	***17,7***	***18,7***
Marihuana	*19,9*	*18,0*	*19,4*	*19,1*	*17,7*	*18,7*
Hašiš	*28,0*	*22,5*	*24,3*	*	*22,5*	*22,5*
Jiné drogy, léky	***32,3***	***34,8***	*33,0*	***28,9***	***26,4***	***28,2***
Neznámá	***27,7***	***23,7***	*27,4*	***28,0***	***25,0***	***27,0***
Celkem	***24,1***	***21,8***	***23,4***	***22,4***	***20,5***	***21,8***
Gambling	***31,1***	***36,2***	*31,3*	***30,3***	***30,7***	***30,3***

Pozn.: Jsou započteni pouze uživatelé drog, u kterých byl identifikován věk.

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Tab. č. 22

Věk prvního užití základní drogy podle základní drogy a věkových skupin

	Všichni klienti v roce 2002 – věkové skupiny prvního užití základní drogy														První léčba v roce 2002 (FTD) – věkové skupiny prvního užití základní drogy												
	do 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 +	nezn.	celk.	do 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 +	nezn.	celk.
Opiáty	**165**	**1234**	**472**	**141**	**55**	**24**	**12**	**2**	**1**	**4**	**1**	**3**	**239**	**2353**	**56**	**368**	**174**	**46**	**17**	**8**	**7**	**1**	**0**	**3**	**1**	**0**	**107**	**788**
Heroin	151	1160	388	85	35	9	6	0	0	0	1	2	223	**2060**	52	328	147	32	9	4	4	0	0	0	1	0	98	**675**
Metadon	0	8	59	41	15	9	2	0	0	1	0	0	1	**136**	0	3	16	8	6	1	2	0	0	1	0	0	0	**37**
Ostatní opiáty	14	66	25	15	5	6	4	2	1	3	0	1	15	**157**	4	37	11	6	2	3	1	1	0	2	0	0	9	**76**
Kokain – celkem	**0**	**7**	**4**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**
Kokain	0	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
Crack	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stimulancia	**438**	**2917**	**636**	**192**	**61**	**16**	**13**	**3**	**0**	**0**	**0**	**1**	**554**	**4831**	**219**	**1543**	**313**	**92**	**25**	**3**	**7**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**392**	**2595**
Amfetamin	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**10**	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
Pervitin	430	2837	621	190	59	16	12	3	0	0	0	0	421	**4589**	212	1483	302	90	25	3	6	1	0	0	0	0	267	**2389**
Extáze	6	64	13	2	1	0	0	0	0	0	0	0	132	**218**	6	50	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	125	**193**
Efedrin	1	9	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	**14**	1	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**7**
Hypnotika,	**4**	**19**	**21**	**14**	**18**	**10**	**5**	**8**	**3**	**0**	**2**	**0**	**10**	**114**	**1**	**3**	**7**	**9**	**3**	**3**	**3**	**3**	**1**	**0**	**1**	**0**	**7**	**41**
Benzodiazepiny	1	7	6	5	7	5	4	6	1	0	1	0	5	**48**	0	1	2	2	1	2	3	2	0	0	0	0	4	**17**
Ostatní sedativa	3	12	15	9	11	5	1	2	2	0	1	0	5	**66**	1	2	5	7	2	1	0	1	1	0	1	0	3	**24**
Halucinogeny	**7**	**29**	**6**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**47**	**1**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**20**
LSD	6	19	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	**34**	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**13**
Psilocybin	1	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
Durman	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Rozpustidla	**120**	**167**	**16**	**6**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**332**	**71**	**82**	**5**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**171**
Toluen	97	150	16	5	1	1	0	1	0	0	0	0	18	**289**	58	75	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9	**149**
Jiná rozpustidla	23	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	**43**	13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	**22**
Kanabinoidy	**575**	**759**	**40**	**19**	**4**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90**	**1489**	**416**	**547**	**26**	**8**	**3**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69**	**1070**
Marihuana	575	756	40	19	4	1	1	0	0	0	0	0	90	**1486**	416	545	26	8	3	1	0	0	0	0	0	0	69	**1068**
Hašiš	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Jiné drogy, léky	**4**	**21**	**7**	**2**	**1**	**6**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**45**	**4**	**12**	**3**	**0**	**0**	**3**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**25**
Neznámá	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**
Celkem	**1313**	**5155**	**1202**	**378**	**141**	**58**	**32**	**15**	**4**	**5**	**3**	**4**	**927**	**9237**	**768**	**2574**	**530**	**156**	**49**	**18**	**17**	**6**	**1**	**4**	**2**	**0**	**594**	**4719**
Gambling	10	96	56	39	20	18	13	8	6	0	0	1	58	**325**	7	62	34	29	11	13	6	6	4	0	0	1	43	**216**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE
uživatelů drog - žadatelů o léčbu
ČR - 2002
Způsob aplikace základní drogy - muži

Tab. č. 23

	Všichni klienti v roce 2002						První léčba v roce 2002 (FTD)					
	injekční	kouření	požití	inhal./šňup.	jiný/neznámo	**celkem**	injekční	kouření	požití	inhal./šňup.	jiný/neznámo	**celkem**
Opiáty	**1355**	**66**	**116**	**42**	**21**	**1600**	**448**	**37**	**39**	**15**	**8**	**547**
Heroin	1277	61	4	42	15	**1399**	413	35	2	15	5	**470**
Metadon	0	0	89	0	2	**91**	0	0	26	0	1	**27**
Ostatní opiáty	78	5	23	0	4	**110**	35	2	11	0	2	**50**
Kokain – celkem	**1**	**1**	**0**	**8**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**
Kokain	1	0	0	8	0	**9**	0	0	0	3	0	**3**
Crack	0	1	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	**0**
Stimulancia	**2598**	**26**	**151**	**372**	**44**	**3191**	**1246**	**14**	**133**	**235**	**23**	**1651**
Pervitin	2585	25	13	368	44	**3035**	1239	13	8	232	23	**1515**
Extáze (MDMA)	2	1	136	0	0	**139**	2	1	123	0	0	**126**
Ost. stimulancia	11	0	2	4	0	**17**	5	0	2	3	0	**10**
Hypnotika, sedativa	**3**	**1**	**54**	**0**	**0**	**58**	**2**	**0**	**15**	**0**	**0**	**17**
Benzodiazepiny	1	1	18	0	0	**20**	1	0	5	0	0	**6**
Ostatní sedativa	2	0	36	0	0	**38**	1	0	10	0	0	**11**
Halucinogeny	**2**	**1**	**37**	**0**	**1**	**41**	**1**	**0**	**15**	**0**	**1**	**17**
LSD	1	1	27	0	1	**30**	1	0	9	0	1	**11**
Psilocybin	1	0	9	0	0	**10**	0	0	6	0	0	**6**
Durman	0	0	1	0	0	**1**	0	0	0	0	0	**0**
Rozpustidla	**0**	**0**	**0**	**283**	**0**	**283**	**0**	**0**	**0**	**147**	**0**	**147**
Toluen	0	0	0	249	0	**249**	0	0	0	128	0	**128**
Jiná rozpustidla	0	0	0	34	0	**34**	0	0	0	19	0	**19**
Kanabinoidy	**0**	**1063**	**6**	**4**	**4**	**1077**	**0**	**759**	**4**	**3**	**3**	**769**
Marihuana	0	1063	6	3	4	**1076**	0	759	4	3	3	**769**
Hašiš	0	0	0	1	0	**1**	0	0	0	0	0	**0**
Jiné drogy, léky	**2**	**2**	**28**	**1**	**0**	**33**	**2**	**2**	**14**	**0**	**0**	**18**
Neznámá	**2**	**1**	**0**	**0**	**6**	**9**	**1**	**0**	**0**	**0**	**3**	**4**
Celkem	**3963**	**1161**	**392**	**710**	**76**	**6302**	**1700**	**812**	**220**	**403**	**38**	**3173**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Tab. č. 24

Způsob aplikace základní drogy - ženy

	Všichni klienti v roce 2002						První léčba v roce 2002 (FTD)					
	injekční	kouření	požití	inhal./šňup.	jiný/neznámo	**celkem**	injekční	kouření	požití	inhal./šňup.	jiný/neznámo	**celkem**
Opiáty	**617**	**30**	**54**	**28**	**12**	**741**	**193**	**14**	**16**	**10**	**6**	**239**
Heroin	585	28	0	28	10	**651**	176	13	0	10	4	**203**
Metadon	0	0	44	0	0	**44**	0	0	10	0	0	**10**
Ostatní opiáty	32	2	10	0	2	**46**	17	1	6	0	2	**26**
Kokain – celkem	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kokain	1	0	0	2	0	**3**	0	0	0	0	0	**0**
Crack	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Stimulancia	**1308**	**13**	**82**	**206**	**17**	**1626**	**707**	**9**	**68**	**137**	**12**	**933**
Pervitin	1305	13	6	204	16	**1544**	705	9	5	137	11	**867**
Extáze (MDMA)	0	0	74	1	0	**75**	0	0	63	0	0	**63**
Ost. stimulancia	3	0	2	1	1	**7**	2	0	0	0	1	**3**
Hypnotika, sedativa	**1**	**0**	**54**	**1**	**0**	**56**	**1**	**0**	**23**	**0**	**0**	**24**
Benzodiazepiny	0	0	28	0	0	**28**	0	0	11	0	0	**11**
Ostatní sedativa	1	0	26	1	0	**28**	1	0	12	0	0	**13**
Halucinogeny	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**
LSD	0	0	4	0	0	**4**	0	0	2	0	0	**2**
Psilocybin	0	0	2	0	0	**2**	0	0	1	0	0	**1**
Durman	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Rozpustidla	**0**	**0**	**0**	**48**	**0**	**48**	**0**	**0**	**0**	**24**	**0**	**24**
Toluen	0	0	0	39	0	**39**	0	0	0	21	0	**21**
Jiná rozpustidla	0	0	0	9	0	**9**	0	0	0	3	0	**3**
Kanabinoidy	**0**	**397**	**3**	**0**	**0**	**400**	**0**	**289**	**3**	**0**	**0**	**292**
Marihuana	0	395	3	0	0	**398**	0	287	3	0	0	**290**
Hašiš	0	2	0	0	0	**2**	0	2	0	0	0	**2**
Jiné drogy, léky	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**7**
Neznámá	**2**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**
Celkem	**1929**	**440**	**211**	**285**	**30**	**2895**	**902**	**312**	**120**	**171**	**19**	**1524**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE
uživatelů drog - žadatelů o léčbu
ČR - 2002
Způsob aplikace základní drogy - celkem

Tab. č. 25

	Všichni klienti v roce 2002						První léčba v roce 2002 (FTD)					
	injekční	kouření	požití	inhal./šňup.	jiný/neznámo	**celkem**	injekční	kouření	požití	inhal./šňup.	jiný/neznámo	**celkem**
Opiáty	**1980**	**98**	**171**	**71**	**33**	**2353**	**643**	**51**	**55**	**25**	**14**	**788**
Heroin	1870	91	4	70	25	**2060**	591	48	2	25	9	**675**
Metadon	0	0	134	0	2	**136**	0	0	36	0	1	**37**
Ostatní opiáty	110	7	33	1	6	**157**	52	3	17	0	4	**76**
Kokain – celkem	**2**	**1**	**0**	**10**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**
Kokain	2	0	0	10	0	**12**	0	0	0	3	0	**3**
Crack	0	1	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	**0**
Stimulancia	**3915**	**39**	**237**	**579**	**61**	**4831**	**1959**	**23**	**205**	**373**	**35**	**2595**
Pervitin	3899	38	19	573	60	**4589**	1950	22	13	370	34	**2389**
Extáze (MDMA)	2	1	214	1	0	**218**	2	1	190	0	0	**193**
Ost. stimulancia	14	0	4	5	1	**24**	7	0	2	3	1	**13**
Hypnotika, sedativa	**4**	**1**	**108**	**1**	**0**	**114**	**3**	**0**	**38**	**0**	**0**	**41**
Benzodiazepiny	1	1	46	0	0	**48**	1	0	16	0	0	**17**
Ostatní sedativa	3	0	62	1	0	**66**	2	0	22	0	0	**24**
Halucinogeny	**2**	**1**	**43**	**0**	**1**	**47**	**1**	**0**	**18**	**0**	**1**	**20**
LSD	1	1	31	0	1	**34**	1	0	11	0	1	**13**
Psilocybin	1	0	11	0	0	**12**	0	0	7	0	0	**7**
Durman	0	0	1	0	0	**1**	0	0	0	0	0	**0**
Rozpustidla	**0**	**0**	**0**	**332**	**0**	**332**	**0**	**0**	**0**	**171**	**0**	**171**
Toluen	0	0	0	289	0	**289**	0	0	0	149	0	**149**
Jiná rozpustidla	0	0	0	43	0	**43**	0	0	0	22	0	**22**
Kanabinoidy	**0**	**1472**	**9**	**4**	**4**	**1489**	**0**	**1057**	**7**	**3**	**3**	**1070**
Marihuana	0	1470	9	3	4	**1486**	0	1055	7	3	3	**1068**
Hašiš	0	2	0	1	0	**3**	0	2	0	0	0	**2**
Jiné drogy, léky	**2**	**2**	**40**	**1**	**0**	**45**	**2**	**2**	**21**	**0**	**0**	**25**
Neznámá	**4**	**1**	**0**	**0**	**8**	**13**	**2**	**0**	**0**	**0**	**4**	**6**
Celkem	**5909**	**1615**	**608**	**998**	**107**	**9237**	**2610**	**1133**	**344**	**575**	**57**	**4719**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 26

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Injekční uživatelé drog podle věku – ze všech léčených uživatelů drog a nově zachycených (FTD)

Věková skupina	Všichni klienti v roce 2002					První léčba v roce 2002 (FTD)				
	Injekční uživatelé		Celkem injekčních uživatelů drog	Počet všech uživatelů		Injekční uživatelé		Celkem injekčních uživatelů drog	Počet všech poprvé evidovaných uživatelů	
	Základní droga	Jiná droga		Celkový počet uživatelů	% injekčních uživatelů	Základní droga	Jiná droga		Celkový počet uživatelů	% injekčních uživatelů
do 15	10	1	**11**	121	***9,1***	8	1	**9**	108	***8,3***
15 - 19	1286	98	**1384**	2652	***52,2***	829	76	**905**	1892	***47,8***
20 - 24	2415	127	**2542**	3427	***74,2***	1004	49	**1053**	1579	***66,7***
25 - 39	2002	82	**2084**	2681	***77,7***	686	20	**706**	989	***71,4***
40 a více	126	5	**131**	246	***53,3***	46	1	**47**	91	***51,6***
neznámá	70	3	**73**	110	***66,4***	37	3	**40**	60	***66,7***
Celkem	**5909**	**316**	**6225**	**9237**	***67,4***	**2610**	**150**	**2760**	**4719**	***58,5***

Pozn.: Nejsou započteni gambleři.

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Tab. č. 27

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR – 2001

Injekční aplikace jakékoliv drogy v současnosti / kdykoliv dříve podle pohlaví

njekční aplikace jakékoliv ogy v současnosti / kdykoliv dříve	Všichni klienti v roce 2002				První léčba v roce 2002 (FTD)			
	Muži	Ženy	eznámo	Celkem	Muži	Ženy	eznámo	Celkem
o, ale ne v současnosti	1275	682	11	**1968**	415	208	8	**631**
o – v současnosti	2921	1345	11	**4277**	1411	738	4	**2153**
kdy	1438	580	13	**2031**	1006	413	9	**1428**
známo	668	288	5	**961**	341	165	1	**507**
lkem	**6302**	**2895**	**40**	**9237*)**	**3173**	**1524**	**22**	**4719**)**

*) u 1312 klientů ze všech udávajících injekční aplikaci základní či další užívané drogy je uvedeno, že neaplikují drogu v současnosti injekčně, u dalších 508 je uvedeno, že není známo, zda v současnosti aplikují drogu injekčně; z těchto 1814 klientů uvedlo1677 injekční aplikaci v minulosti

**) u nově zachycených klientů udávajících injekční aplikaci základní či další užívané drogy neaplikuje v současnosti injekčně či není tato skutečnost známa u 418, resp. 152 klientů; z těchto 570 klientů uvedlo 504 injekční aplikaci v minulosti

Tab. č. 28

Injekční aplikace jakékoliv drogy všemi klienty v současnosti / kdykoliv dříve - podle základní drogy

Základní droga	Injekční aplikace jakékoliv drogy (základní, sekundární) v současnosti / kdykoliv dříve				Celkem
	Ano, ale ne v současnosti	Ano - v současnosti	Nikdy	Neznámo	
Opiáty - celkem	**744**	**1330**	**146**	**133**	**2353**
Heroin	597	1226	116	121	**2060**
Metadon	115	16	2	3	**136**
Ostatní opiáty	32	88	28	9	**157**
Kokain - celkem	**1**	**1**	**8**	**3**	13
Kokain	1	1	7	3	**12**
Crack	0	0	1	0	**1**
Stimulancia - celkem	**1031**	**2850**	**619**	**331**	4831
Pervitin	1018	2833	439	299	**4589**
MDMA, jiné deriváty	7	8	175	28	**218**
další stimulancia	6	9	5	4	**24**
Hypnotika, sedativa - celkem	**6**	**2**	**78**	**28**	114
Barbituráty	2	0	10	2	**14**
Benzodiazepiny	2	1	39	6	**48**
Ostatní sedativa	2	1	29	20	**52**
Halucinogeny - celkem	**8**	**6**	**21**	**12**	47
LSD	6	5	14	9	**34**
Ostatní halucinogeny	2	1	7	3	**13**
Rozpustidla	**32**	**14**	**220**	**66**	**332**
Kanabinoidy	**138**	**70**	**910**	**371**	**1489**
Jiné drogy, léky	**8**	**1**	**27**	**9**	**45**
Neznámo	**0**	**3**	**2**	**8**	**13**
Celkem	**1968**	**4277**	**2031**	**961**	**9237**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 29

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Věk prvního injekčního užití drogy

Věk první injekční aplikace drogy (N případů)	Všichni klienti v roce 2002			První léčení v roce 2002 (FTD)		
	Počet	% z uživatelů udávajících injekční aplikaci drogy (N = 6225)	% ze všech uživatelů drog (N = 9237)	Počet	% z uživatelů udávajících injekční aplikaci drogy (N = 2760)	% ze všech uživatelů drog (N = 4719)
do 15	**376**	***6,0***	***4,1***	**153**	***5,5***	***3,2***
15 - 19	**3157**	***50,7***	***34,2***	**1384**	***50,1***	***29,3***
20 - 24	751	*12,1*	*8,1*	316	*11,4*	*6,7*
25 - 39	302	*4,9*	*3,3*	124	*4,5*	*2,6*
40 a více	24	*0,4*	*0,3*	10	*0,4*	*0,2*
Neznámý	1017	*16,3*	*11,0*	585	*21,2*	*12,4*
Neuvedeno	598	*9,6*	*6,5*	188	*6,8*	*4,0*
Neužívá injekčně	3012	*	*32,6*	1959	*	*41,5*
Celkem uživatelů	**9237**	***100,0***	***100,0***	**4719**	***100,0***	***100,0***

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE
uživatelů drog - žadatelů o léčbu
ČR – 2002

Tab. č. 30

Frekvence užití základní drogy

	Všichni klienti v roce 2002						První léčení v roce 2002 (FTD)					
	Ne v posl. měsíci	1x týdně či méně	2x-6x týdně	Denně	Neznámo	Celkem	Ne v posl. měsíci	1x týdně či méně	2x-6x týdně	Denně	Neznámo	Celkem
Opiáty - celkem	**490**	**143**	**386**	**1168**	**166**	**2353**	**101**	**53**	**175**	**389**	**70**	**788**
Heroin	464	124	348	975	149	**2060**	93	46	153	321	62	**675**
Metadon	1	0	0	135	0	**136**	0	0	0	37	0	**37**
Ostatní opiáty	25	19	38	58	17	**157**	8	7	22	31	8	**76**
Kokain - celkem	**5**	**3**	**1**	**2**	**2**	**13**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**3**
Kokain	5	3	1	1	2	**12**	2	0	0	1	0	**3**
Crack	0	0	0	1	0	**1**	0	0	0	0	0	**0**
Stimulancia - celkem	**974**	**1330**	**1462**	**664**	**401**	**4831**	**341**	**797**	**852**	**376**	**229**	**2595**
Pervitin	951	1154	1440	657	387	**4589**	328	629	837	372	223	**2389**
Extáze (MDMA)	18	174	14	2	10	**218**	12	166	9	1	5	**193**
další stimulancia	5	2	8	5	4	**24**	1	2	6	3	1	**13**
Hypnotika, sedativa	**26**	**10**	**24**	**41**	**13**	**114**	**3**	**3**	**9**	**20**	**6**	**41**
Barbituráty	4	2	2	4	2	**14**	2	1	2	2	2	**9**
Benzodiazepiny	11	3	5	22	7	**48**	1	1	2	10	3	**17**
Ostatní sedativa	11	5	17	15	4	**52**	0	1	5	8	1	**15**
Halucinogeny	**11**	**21**	**5**	**2**	**8**	**47**	**5**	**7**	**4**	**0**	**4**	**20**
LSD	7	17	4	0	6	**34**	2	5	3	0	3	**13**
Ostatní halucinogeny	4	4	1	2	2	**13**	3	2	1	0	1	**7**
Rozpustidla	**52**	**77**	**101**	**79**	**23**	**332**	**22**	**45**	**54**	**35**	**15**	**171**
Kanabinoidy	**237**	**396**	**487**	**241**	**128**	**1489**	**142**	**295**	**352**	**184**	**97**	**1070**
Jiné drogy, léky	**6**	**14**	**12**	**12**	**1**	**45**	**2**	**9**	**8**	**6**	**0**	**25**
Neznámo	**2**	**0**	**2**	**1**	**8**	**13**	**0**	**0**	**2**	**0**	**4**	**6**
Celkem	**1803**	**1994**	**2480**	**2210**	**750**	**9237**	**618**	**1209**	**1456**	**1011**	**425**	**4719**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Tab. č. 31

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002 Drogy užívané v kombinaci se základní drogou

Skupiny základních drog	Všichni klienti v roce 2002						První léčba v roce 2002 (FTD)					
	Muži		Ženy		Celkem osob	% ze všech klientů	Muži		Ženy		Celkem osob	% z FTD klientů
	Počet	*%*	*Počet*	*%*			*Počet*	*%*	*Počet*	*%*		
Opiáty – celkem	**622**	***70,8***	**256**	***29,2***	**878**	***9,5***	**242**	***69,9***	**104**	***30,1***	**346**	***7,3***
Heroin	463	*71,6*	184	*28,4*	**647**	***7,0***	193	*71,0*	79	*29,0*	**272**	***5,8***
Morfin	6	*54,5*	5	*45,5*	**11**	***0,1***	1	*25,0*	3	*75,0*	**4**	***0,1***
Kodein	36	*75,0*	12	*25,0*	**48**	***0,5***	11	*64,7*	6	*35,3*	**17**	***0,4***
Brown	29	*58,0*	21	*42,0*	**50**	***0,5***	6	*60,0*	4	*40,0*	**10**	***0,2***
Metadon	9	*60,0*	6	*40,0*	**15**	***0,2***	2	*100,0*	0	*0*	**2**	***0,0***
Ostatní opiáty	79	*73,8*	28	*26,2*	**107**	***1,2***	29	*70,7*	12	*29,3*	**41**	***0,9***
Kokain – celkem	**57**	***66,3***	**29**	***33,7***	**86**	***0,9***	**17**	***53,1***	**15**	***46,9***	**32**	***0,7***
Kokain	55	*65,5*	29	*34,5*	**84**	***0,9***	16	*51,6*	15	*48,4*	**31**	***0,7***
Crack	2	*100*	0	*0*	**2**	***0,0***	1	*100,0*	0	*0*	**1**	***0,0***
Stimulancia - celkem	**1262**	***65,7***	**649**	***33,8***	**1920***	***20,8***	**624**	***65,4***	**326**	***34,2***	**954°**	***20,2***
Amfetamin	2	*50,0*	2	*50,0*	**4**	***0,0***	1	*50,0*	1	*50,0*	**2**	***0,0***
Pervitin	907	*68,6*	408	*30,8*	**1323***	***14,3***	382	*70,3*	158	*29,1*	**543°**	***11,5***
Extáze (MDMA)	344	*59,3*	235	*40,5*	**580***	***6,3***	238	*59,1*	164	*40,7*	**403°**	***8,5***
Efedrin, fenmetrazin	9	*69,2*	4	*30,8*	**13**	***0,1***	3	*50,0*	3	*50,0*	**6**	***0,1***
Hypnotika, sedativa	**145**	***62,5***	**85**	***36,6***	**232***	***2,5***	**39**	***61,9***	**24**	***38,1***	**63**	***1,3***
Benzodiazepiny	45	*67,2*	21	*31,3*	**67***	***0,7***	9	*60,0*	6	*40,0*	**15**	***0,3***
Ostatní sedativa	100	*60,6*	64	*38,8*	**165***	***1,8***	30	*62,5*	18	*37,5*	**48**	***1,0***
Halucinogeny – celkem	**368**	***75,1***	**120**	***24,5***	**490***	***5,3***	**192**	***77,4***	**55**	***22,2***	**248°**	***5,3***
LSD	250	*75,5*	81	*24,5*	**331**	***3,6***	135	*75,8*	43	*24,2*	**178**	***3,8***
Trifenidyl	11	*78,6*	3	*21,4*	**14**	***0,2***	3	*100,0*	0	*0*	**3°**	***0,1***
Psilocybin	103	*74,1*	34	*24,5*	**139***	***1,5***	51	*81,0*	11	*17,5*	**63**	***1,3***
Durman	4	*66,7*	2	*33,3*	**6**	***0,1***	3	*75,0*	1	*25,0*	**4**	***0,1***
Rozpustidla - celkem	**196**	***75,1***	**62**	***23,8***	**261***	***2,8***	**85**	***77,3***	**23**	***20,9***	**110°**	***2,3***
Toluen	165	*74,7*	54	*24,4*	**221***	***2,4***	68	*76,4*	20	*22,5*	**89°**	***1,9***
Jiná rozpustidla	31	*77,5*	8	*20,0*	**40***	***0,4***	17	*81,0*	3	*14,3*	**21°**	***0,4***
Kanabinoidy – celkem	**1840**	***69,1***	**810**	***30,4***	**2661***	***28,8***	**865**	***67,7***	**405**	***31,7***	**1278°**	***27,1***
Marihuana	1804	*69,2*	794	*30,4*	**2608***	***28,2***	846	*67,7*	395	*31,6*	**1249°**	***26,5***
Hašiš	36	*67,9*	16	*30,2*	**53***	***0,6***	19	*65,5*	10	*34,5*	**29**	***0,6***
Jiné drogy, léky	**56**	***81,2***	**13**	***18,8***	**69**	***0,7***	**27**	***90,0***	**3**	***10,0***	**30**	***0,6***
Alkohol v komb. s drogou	**347**	***76,3***	**104**	***22,9***	**455***	***4,9***	**139**	***72,8***	**49**	***25,7***	**191°**	***4,0***
Neznámá	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Gambling	6	*85,7*	1	*14,3*	**7**	***0,1****	3	*0*	0	*0*	**3**	***0,1****

** % z celkového počtu nově evidovaných uživatelů drog - žadatelů o léčbu včetně gamblingu (= 9562 osob, resp. 4935 osob)

Pozn.: Z celkového počtu 9237 uživatelů užívá v kombinaci druhou drogu 5169 osob, z nich 1890 užívá ještě třetí drogu; mezi 4719 poprvé evidovanými klienty druhou drogu užívá 2427 osob, ještě třetí pak 828 osob

* u 9 uživatelů stimulancií, 2 uživatelů sedativ, 2 uživatelů halucinogenů, 3 uživatelů rozpustidel, 11 uživatelů kanabinoidů a 4 uživatelů alkoholu s drogou není známo pohlaví

° u 4 uživatelů stimulancií, 2 uživatelů rozpustidel, 8 uživatelů marihuany, 1 uživatele halucinogenů a 3 uživatelů alkoholu s drogou není známo pohlaví

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Tab. č. 32

Drogy užívané v kombinaci se základní drogou podle skupin základní drogy

	Všichni klienti v roce 2002													První léčba v roce 2002 (FTD)											
	Opiáty	*z toho Heroin*	**Kokain**	**Stimulancia**	*z toho Pervitin*	**Hypnotika, sedativa**	**Halucinogeny**	**Rozpustidla**	**Kanabinoidy**	**Alkohol**	**Jiné drogy, léky**	**Neznámo**	**Celkem**	**Opiáty**	*z toho Heroin*	**Kokain**	**Stimulancia**	*z toho Pervitin*	**Hypnotika, sedativa**	**Halucinogeny**	**Rozpustidla**	**Kanabinoidy**	**Alkohol**	**Jiné drogy, léky**	**Neznámo**	**Celkem**
Opiáty	**91**	**27**	**24**	**946**	**912**	**114**	**41**	**24**	**485**	**61**	**16**	**0**	**1802**	**22**	**3**	**3**	**310**	**290**	**23**	**11**	**5**	**161**	**20**	**4**	**0**	**559**
Heroin	62	*	24	893	863	104	38	17	451	45	12	0	**1646**	17	*	3	287	268	18	10	3	144	12	2	0	**496**
Metadon	9	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**10**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Ostatní opiáty	20	19	0	53	49	9	3	7	34	16	4	0	**146**	5	3	0	23	22	5	1	2	17	8	2	0	**63**
Kokain – celkem	**1**	**1**	**0**	**4**	**2**	**1**	**0**	**0**	**4**	**1**	**1**	**0**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Kokain	1	1	0	4	2	1	0	0	4	1	1	0	**12**	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**
Crack	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stimulancia	**677**	**535**	**59**	**414**	**27**	**78**	**248**	**161**	**1965**	**178**	**30**	**0**	**3810**	**286**	**241**	**28**	**265**	**15**	**29**	**111**	**50**	**999**	**57**	**12**	**0**	**1837**
Pervitin	671	532	59	387	*	78	236	157	1893	174	28	0	**3683**	283	239	28	249	*	29	105	48	946	56	11	0	**1755**
Extáze (MDMA)	3	2	0	20	19	0	11	2	64	2	1	0	**103**	3	2	0	12	11	0	6	1	47	0	1	0	**70**
Ostatní stimulancia	3	1	0	7	8	0	1	2	8	2	1	0	**24**	0	0	0	4	4	0	0	1	6	1	0	0	**12**
Hypnotika, sedativa	**5**	**1**	**0**	**3**	**2**	**10**	**0**	**1**	**11**	**31**	**3**	**0**	**64**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**3**	**8**	**1**	**0**	**15**
Benzodiazepiny	1	0	0	0	0	7	0	0	4	8	1	0	**21**	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	**3**
Ostatní sedativa	4	1	0	3	2	3	0	1	7	23	2	0	**43**	1	1	0	0	0	1	0	0	2	7	1	0	**12**
Halucinogeny	**2**	**1**	**1**	**14**	**9**	**0**	**4**	**1**	**23**	**5**	**1**	**0**	**51**	**1**	**0**	**0**	**4**	**3**	**0**	**1**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**17**
LSD	1	1	1	14	9	0	1	1	16	4	1	0	**39**	0	0	0	4	3	0	0	0	8	0	0	0	**12**
Psilocybin	1	0	0	0	0	0	3	0	7	1	0	0	**12**	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	**5**
Durman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Rozpustidla	**7**	**5**	**0**	**61**	**55**	**7**	**8**	**7**	**126**	**19**	**3**	**0**	**238**	**4**	**3**	**0**	**21**	**19**	**1**	**4**	**6**	**69**	**4**	**2**	**0**	**111**
Toluen	6	5	0	59	53	5	7	6	98	15	3	0	**199**	4	3	0	21	19	1	4	5	54	3	2	0	**94**
Jiná rozpustidla	1	0	0	2	2	2	1	1	28	4	0	0	**39**	0	0	0	0	0	0	0	1	15	1	0	0	**17**
Kanabinoidy celkem	**90**	**75**	**2**	**473**	**312**	**17**	**189**	**65**	**26**	**128**	**15**	**0**	**1005**	**30**	**23**	**1**	**353**	**215**	**7**	**121**	**48**	**18**	**81**	**11**	**0**	**670**
Marihuana	90	75	2	473	312	17	189	65	25	127	15	0	**1003**	30	23	1	353	215	7	121	48	17	81	11	0	**669**
Hašiš	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	**2**	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**
Jiné drogy, léky	4	2	0	1	1	5	0	1	8	14	0	0	**33**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**6**	**8**	**0**	**0**	**17**
Neznámá	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Celkem	**877**	**647**	**86**	**1917**	**1320**	**232**	**490**	**260**	**2649**	**437**	**69**	**0**	**7017**	**346**	**272**	**32**	**953**	**542**	**63**	**248**	**109**	**1268**	**178**	**30**	**0**	**3227**
Gambling	1	0	0	3	3	0	0	1	12	16	0	0	**33**	0	0	0	1	1	0	0	1	10	13	0	0	**25**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Tab. č.33

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Pořadí oblíbenosti / dostupnosti drog v procentech

Pořadí (ze všech uživatelů drog v roce 2002)	**Droga** (včetně užívání v kombinacích)	**% ze všech uživatelů drog v roce 2002**	**Nově evidovaní klienti (FTD) v roce 2002**		
			Počet nově evidovaných uživatelů	% z nově evidovaných uživatelů	Pořadí u nově evidovaných uživatelů
1.	Pervitin	***64,0***	2932	*62,1*	1.
2.	Marihuana	***44,3***	2317	*49,1*	2.
3.	Heroin	***29,3***	947	*20,1*	3.
4.	Extáze	***8,6***	596	*12,6*	4.
5.	Toluen a jiná rozpustidla	***6,4***	281	*6,0*	5.
6.	Alkohol v kombinaci s drogou	***4,9***	191	*4,0*	6. – 7.
7.	LSD	***4,0***	191	*4,0*	6. – 7.
mimo pořadí	*Gambling*	***3,5***	219	*4,4*	*mimo pořadí (6)*
8.	Ostatní opiáty	***2,1***	90	*1,9*	8.
9.	Sedativa, hypnotika	***1,7***	49	*1,0*	11.
10. – 11.	Metadon	***1,6***	39	*0,8*	12.
10. – 11.	Psilocybin	***1,6***	70	*1,5*	9.
12. – 13.	Benzodiazepiny	***1,2***	32	*0,7*	14.
12. – 13.	Jiné drogy a léky	***1,2***	55	*1,2*	10.
14.	Kokain	***1,0***	34	*0,7*	13.

*) Vzhledem k nejrůznějším kombinacím dvou a více drog převyšuje součet 100 %.

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Graf č. 1

Incidence a prevalence uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Léčebně/kontaktní centra podle typu zařízení



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Graf č. 2

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog ČR - 2002

Klienti podle typu zařízení

První léčba:



Všichni klienti:



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog
ČR - 2002
Zaměstnání nově evidovaných a všech léčených uživatelů drog

Graf č. 3

První léčba:



Všichni klienti:



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog

ČR - 2002

Skupiny základních drog - proporcionální zastoupení

Graf č. 4

První léčba



Všichni klienti



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Graf č. 5

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog ČR – 2002

Skupiny základních drog – proporcionální zastoupení



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog ČR - 2002

Graf č. 6

Specifická incidence a prevalence ve věkové skupině 15 - 39 let/100 000 obyvatel - srovnání ČR a krajů



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog ČR - 2002

Graf č. 7

Skupiny základní drogy podle krajů - nově evidovaní klienti



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog ČR - 2002

Graf č. 8

Skupiny základní drogy podle krajů - všichni klienti



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Léčení uživatelé drog podle věku
ČR - 2002

Graf č. 9

Všichni klienti v roce 2002

muži:



ženy:



První léčba v roce 2002

muži:



ženy:



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog ČR - 2002

Graf č. 10

Průměrný věk uživatelů vybraných drog podle pohlaví



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog ČR - 2002

Graf č. 11

Věk prvního užití základní drogy nově evidovanými klienty podle věkových skupin (skupina základní drogy = 100 %)



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog ČR - 2002

Graf č. 12

Věk prvního užití základní drogy všemi klienty podle věkových skupin (skupina základní drogy = 100 %)



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog ČR - 2002 Způsob aplikace základní drogy

Graf č. 13

Všichni klienti



První léčba



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog ČR - 2002

Graf č. 14



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog ČR - 2002

Graf č. 15

Frekvence užívání základní drogy

Všichni klienti

Heroin a pervitin:



Ostatní drogy:



První léčba

Heroin a pervitin:



Ostatní drogy:



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Graf č. 16

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog ČR - 2002

Drogy užívané novými klienty jako základní a sekundární



Pozn.: Jsou znázorněny drogy užité 50 a více klienty ze všech, pořadí drog je podle užití všemi klienty.

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Graf č. 17

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog ČR - 2002

Drogy užívané všemi klienty jako základní a sekundární



Pozn.: Jsou znázorněny drogy užité 50 a více klienty.

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

INCIDENCE A PREVALENCE PROBLÉMOVÝCH UŽIVATELŮ DROG

Ve smyslu definice EMCDDA o problémovém užívání drog (viz Zdroje informací, definice a metodika) byly zpracovány údaje o těchto uživatelích za rok 2002.

V *tabulce č. 34* jsou sumární údaje o počtech evidovaných problémových uživatelů drog podle pohlaví. Celkem lze takto klasifikovat 3 472 osob, tj. 73,6 % ze všech žadatelů o první léčbu, mezi všemi klienty to bylo 7 441 osob, tj. 80,6 %.

Evidovaní problémoví uživatelé byli dále rozděleni na problémové uživatele s injekční aplikací drogy a s aplikací neinjekční - a to podle pohlaví (*tabulka č. 35*). Mezi žadateli o prvou léčbu bylo celkem 2 761 injekčních uživatelů drog, což je 79,5 % z 3 472 žadatelů o prvou léčbu. Mezi všemi klienty pak 6 228 injekčních uživatelů drog znamená 83,7 % ze všech 7 441 problémových uživatelů drog.

V *tabulce č. 36* jsou léčení problémoví uživatelé rozděleni podle pohlaví a věkových skupin. Porovnáme-li tuto věkovou distribuci s věkovou distribucí všech léčených klientů (*tabulka č. 15*), pak je zřejmé, že problémoví uživatelé drog jsou starší jak mezi žadateli o prvou léčbu, tak i mezi všemi klienty. V absolutních počtech dominují věkové skupiny 20 - 25 let a mezi všemi klienty ještě i věková skupina 25 – 39 let. Za zmínku stojí i vysoké počty mezi všemi klienty věkové skupiny 15 - 19 let.

Cílem poslední *tabulky č. 37* bylo posoudit rozdílnou incidenci a prevalenci léčených problémových uživatelů v jednotlivých krajích. Vysoká incidence i prevalence problémových uživatelů drog v Ústeckém kraji a Praze koresponduje s rozšířeným užíváním heroinu v těchto krajích, ale bude i odrazem hustoty, oblíbenosti, zkušeností i efektivity práce L/K center v jednotlivých krajích.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 34

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE léčených problémových uživatelů drog ČR - 2002

Problémoví uživatelé drog podle pohlaví

		Muži	Ženy	Neznámo	Celkem problém. uživatelů	Celkem všech klientů	z toho % problémových uživatelů drog
První léčení problémových uživatelů drog v roce 2002 (FTD)	**Počet**	2273	1188	11	**3472**	**4719**	***73,6***
	%	*65,5*	*34,2*	*0,3*	***100***		
Všichni problémoví uživatelé drog v roce 2002	**Počet**	4991	2425	25	**7441**	**9237**	***80,6***
	%	*67,1*	*32,6*	*0,3*	***100***		

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Tab. č. 35

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE léčených problémových uživatelů drog ČR - 2002

Problémoví uživatelé drog podle způsobu aplikace

		Muži		Ženy		Celkem
		Počet	%	*Počet*	%	
První léčení problémových uživatelů drog v roce 2002 (FTD)	**Injekční uživatelé drog**	1806	*65,4*	945	*34,2*	**2761**
	Neinjekční uživatelé drog	467	*65,7*	243	*34,2*	**711**
	Celkem	**2273**	***65,5***	**1188**	***34,2***	**3472**
Všichni problémoví uživatelé drog v roce 2002	**Injekční uživatelé drog**	4190	*67,3*	2018	*32,4*	**6228**
	Neinjekční uživatelé drog	801	*66,0*	407	*33,6*	**1213**
	Celkem	**4991**	***67,1***	**2425**	***32,6***	**7441**

Pozn.: U 11 nových problémových uživatelů drog a u 25 ze všech problémových uživatelů drog není známo pohlaví

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 36

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE léčených problémových uživatelů drog ČR - 2002

Problémoví uživatelé drog podle pohlaví a věkových skupin

		Pohlaví			Celkem	Počet osob / 100 000 obyvatel
		Muži	Ženy	Neznámo		
První léčení problémových uživatelů drog v roce 2002 (FTD)	do 15 let	8	7	0	**15**	***0,9***
	15 – 19 let	617	567	2	**1186**	***171,7***
	20 – 25 let	862	418	4	**1284**	***147,5***
	25 – 39 let	700	172	0	**872**	***39,4***
	40 a více let	56	11	0	**67**	***1,4***
	Neznámo	30	13	5	**48**	*
	Celkem	**2273**	**1188**	**11**	**3472**	***33,8***
Všichni problémoví uživatelé drog v roce 2002	do 15 let	9	9	0	**18**	***1,1***
	15 – 19 let	898	849	4	**1751**	***253,5***
	20 – 25 let	1935	1031	9	**2974**	***341,6***
	25 – 39 let	1945	494	4	**2443**	***110,3***
	40 a více let	150	20	0	**170**	***3,5***
	Neznámo	54	23	8	**85**	*
	Celkem	**4991**	**2425**	**25**	**7441**	***72,4***

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 37

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE léčených problémových uživatelů drog ČR - 2002

Incidence, prevalence, specifická věková incidence a prevalence problémových uživatelů drog na 100 000 obyvatel v ČR a podle krajů

Kraj	Všichni klienti				Z toho ve věkové skupině 15-39 let			
	Incidence (FTD)		Prevalence		Incidence (FTD)		Prevalence	
	Počet	/ incidence na 100 000 obyvatel	Počet	/ prevalence na 100 000 obyvatel	Počet	/ incidence na 100 000 obyvatel	Počet	/ prevalence na 100 000 obyvatel
Praha	478	***40,4***	1197	***101,1***	457	***110,1***	1148	***276,6***
Středočeský	291	***26,1***	558	***50,1***	286	***71,1***	548	***136,3***
Jihočeský	207	***33,1***	462	***73,8***	188	***81,4***	428	***185,3***
Plzeňský	177	***32,1***	254	***46,0***	168	***84,1***	236	***118,1***
Karlovarský	75	***24,6***	137	***45,0***	73	***63,8***	132	***115,3***
Ústecký	640	***77,4***	1482	***179,2***	623	***200,2***	1443	***463,8***
Liberecký	111	***25,9***	187	***43,6***	106	***66,5***	179	***112,3***
Královéhradecký	131	***23,8***	185	***33,6***	131	***65,9***	184	***92,5***
Pardubický	110	***21,6***	147	***28,9***	109	***58,5***	146	***78,3***
Vysočina	125	***24,0***	317	***60,8***	121	***62,2***	305	***156,9***
Jihomoravský	432	***38,0***	1030	***90,6***	424	***101,3***	1003	***239,5***
Olomoucký	222	***34,6***	513	***80,0***	214	***89,4***	490	***204,8***
Zlínský	182	***30,4***	411	***68,7***	173	***77,1***	399	***177,8***
Moravskoslezský	291	***22,7***	561	***43,8***	269	***55,8***	527	***109,3***
Česká republika	**3472**	***33,8***	**7441**	***72,4***	**3342**	***88,5***	**7168**	***189,8***

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

ODHAD PREVALENCE VŠECH PROBLÉMOVÝCH UŽIVATELŮ DROG V ČR

Součástí výroční zprávy je, podobně jako v uplynulých třech letech, odhad prevalence všech problémových uživatelů drog, tedy včetně tzv. skryté populace. Tato populace uživatelů drog není v kontaktu s L/K centry, popřípadě kontakt existuje, ale nesplňuje kritéria definice žádosti o léčbu (viz Zdroje informací, definice, metodika) a nebyli tedy evidováni v drogovém informačním systému.

Východiskem odhadu byl počet hlášení o všech léčených problémových uživatelích drog v roce 2002.

Tento údaj byl dále zpracován multiplikační metodou s použitím tzv. in-treatment rate (ITR), což je podíl problémových uživatelů drog v kontaktu s léčebným zařízením z celkového počtu těchto uživatelů. Vydělíme-li roční počet léčených problémových uživatelů drog (L) těmito podíly (ITR), dostáváme odhad celé zmíněné populace (PU):

$$PU = L / ITR.$$

ITR byl stanoven v rámci studie „Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy“[1] (PAD) dvěma rozdílnými metodami v odlišném rozpětí, a to 15 - 20 % (metodou zpětného záchytu, capture-recapture) a 20 - 37 % (v rámci kvalitativního výzkumu). Uvádíme výpočty s použitím obou těchto rozpětí ITR.

Tyto hodnoty ITR používáme s vědomím pravděpodobných nepřesností. Ukazatel bude asi rozdílný pro muže a ženy, různé věkové skupiny i různé drogy. Bude závislý i na oblíbenosti a dostupnosti léčebných zařízení, poskytujících služby problémovým uživatelům drog, a tak se také téměř jistě bude měnit v čase.

Pro mezinárodní srovnávání je doporučeno uvádět prevalenci pro věkovou skupinu 15 - 64 let. Do našich údajů jsme zahrnuli 18 uživatelů mladších než 15 let (1x heroin jako základní droga, 14 x pervitin, 3x ostatní drogy) a 2 uživatele starší než 64 let, užívající „ostatní opiáty“. Těchto 20 osob tvoří pouze 0,3 % evidovaných problémových uživatelů drog a neovlivňují další výpočty.

[1] Zábranský T., Mravčík V., Gajdošíková H., Miovský M.: Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy v ČR (Souhrnná závěrečná zpráva). Praha ResAd, 2001.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Výsledky

Jsou shrnuty v *tabulkách č. 38, 39*.

Předpokládáme-li rozpětí ITR 17,5 %, je v ČR 45 500 problémových uživatelů drog, tj. 4,4/1 000 obyvatel věkové skupiny 15 – 64 let. (Rozpětí ITR 15 – 20 % by odpovídaly počty 37 200 – 49 600 osob.)

Předpokládáme-li rozpětí ITR 28,5 %, je v ČR 26 100 problémových uživatelů drog, tj. 2,5/1000 obyvatel. (Rozpětí ITR 15 - 20% by odpovídaly počty 20 100 – 37 200 osob).

Použijeme-li ke konečnému odhadu průměr středních hodnot obou těchto výpočtů, docházíme k odhadu 34 300 problémových uživatelů drog v roce 2002. Z toho je 23 100 mužů a 11 200 žen, 10 900 uživatelů opiátů, 21 200 uživatelů amfetaminů a 2 200 ostatních problémových uživatelů drog. Odhad injekčních uživatelů drog je 28 800 osob.

Srovnání odhadu s předchozími roky je obtížné. Odhad pro rok 2001 byl proveden za použití dvou hodnot ITR, avšak výchozí počty léčených osob byly získány jinou metodou.

Pro rok 2001 byly odpovídající odhady 48 600 resp. 29 800, s průměrem 39 200 problémových uživatelů, tedy o 4 900 méně než v roce 2002. Meziroční snížení odhadovaného počtu problémových uživatelů však nelze - vzhledem k nedostatečné citlivosti a rozdílnosti metod - považovat za prokázané. Pro rok 2000 byla obdobná metodika použita ve zmíněné studii PAD, kde byla průměrná hodnota stanovena 37 500 problémových uživatelů drog.

Srovnání se zeměmi Evropské unie [2]:

Střední odhad prevalence problémových uživatelů drog se pohybuje v jednotlivých zemích od 2,6 do 9,3 na 1 000 obyvatel věkové skupiny 15 - 64 let. Země nám nejbližší, Rakousko a Německo, uvádějí hodnotu 3,2. Pokud jde o injekční uživatele drog, odhady v zemích EU se pohybují v rozmezí 2,2 - 6,7/1 000 obyvatel ve věku 15 – 64 let, většinou jsou v rozmezí 3,0 - 4,5/1 000 obyvatel**. Odhady prevalence pro ČR – 4,8 problémových resp. 4,0 injekčních uživatelů na 1000 obyvatel ve věku 15 - 64 let by nás řadily do středu pomyslné tabulky zemí Evropské Unie.** Ve většině zemí EU převažují mezi problémovými uživateli drog uživatelé opiátů, pouze ve Finsku a Švédsku je častější zneužívání amfetaminů, tak jako u nás.

[2] EMCDDA: 2002 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway. Luxembourg, 2002.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 38

ODHAD ROČNÍ PREVALENCE
za rok 2002
Odhad prevalence všech problémových uživatelů opiátů, amfetaminů a injekčních

Základní droga	Opiáty (z toho heroin)	Amfetaminy (z toho pervitin)	Ostatní*)	CELKEM	Injekční uživatelé základní i sekundární drogy
Evidovaní problémoví uživatelé	**2353** (2060)	**4599** (4589)	**489**	**7441**	**6228**
Prevalenční odhady všech problémových uživatelů					
ITR = 17,5 %	**13 400** (11 800)	**26 300** (26 200)	**2800**	**42 500**	**35 600**
prevalenční odhad / 1000 obyvatel věkové skupiny 15 – 64 let	1,9	3,6	0,4	**5,9**	4,9
ITR = 15 – 20 %	11 800 – 15 700	23 000 – 30 700	2400 – 3300	**37 200 – 49 600**	31 100 – 41 500
ITR = 28,5 %	**8300** (7200)	**16 100** (16 100)	**1700**	**26 100**	**21 800**
prevalenční odhad / 1000 obyvatel věkové skupiny 15 – 64 let	1,1	2,2	0,2	**3,6**	3,0
ITR = 20 – 37 %	6400 – 11 800	12 400 – 23 000	1300 – 2400	**20 100 – 37 200**	16 800 – 31 100
PRŮMĚR OBOU ODHADŮ	**10 900** (9 500)	**21 200** (21 100)	**2200**	**34 300**	**28 800**
prevalenční odhad / 1000 obyvatel věkové skupiny 15 – 64 let	**1,5**	**2,9**	**0,3**	**4,8**	**4,0**

ITR, in-treatment rate = podíl uživatelů, kteří jsou v kontaktu s léčebným zařízením z celkového počtu těchto uživatelů.

*) „Ostatní“ problémoví uživatelé – užívají jakkoli kokain a/nebo užívají injekčně základní drogu jinou než opiáty či amfetaminy nebo užívají injekčně pouze sekundární drogu (včetně opiátů a amfetaminů).

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 39

ODHAD ROČNÍ PREVALENCE
za rok 2002

Odhad prevalence všech problémových uživatelů opiátů, amfetaminů a injekčních podle pohlaví

Základní droga	Opiáty			Amfetaminy			CELKEM včetně ostatních**)			Injekční uživatelé základní i sekundární drogy		
	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem
Evidovaní problémoví uživatelé	1600	741	**2353*)**	3042	1547	**4599*)**	4991	2425	**7441*)**	4190	2018	**6228*)**
Prevalenční odhady všech problémových uživatelů												
ITR = 17,5 %	9200	4200	**13 400**	17 400	8900	**26 300**	28 600	13 900	**42 500**	24 000	11 600	**35 600**
ITR = 28,5 %	5700	2600	**8300**	10 700	5400	**16 100**	17 600	8500	**26 100**	14 800	7100	**21 900**
PRŮMĚR OBOU ODHADŮ	7500	3400	**10 900**	14 100	7200	**21 200**	23 100	11 200	**34 300**	19 400	9400	**28 800**
prevalenční odhad / 1000 obyvatel věkové skupiny 15 – 64 let	2,1	0,9	**1,5**	3,9	1,9	**2,9**	6,4	3,1	**4,8**	5,3	2,6	**4,0**

ITR, in-treatment rate = podíl uživatelů, kteří jsou v kontaktu s léčebným zařízením z celkového počtu těchto uživatelů.

*) počet evidovaných uživatelů je pro jednotlivá pohlaví nižší než celkový počet, protože pohlaví nebylo evidováno u 12 uživatelů opiátů, 10 uživatelů amfetaminů a 3 ostatních problémových uživatelů (z toho 20 uživatelů bylo injekčních).

**) „ostatní“ problémoví uživatelé – užívají jakkoli kokain nebo užívají injekčně základní drogu jinou než opiáty či amfetaminy nebo užívají injekčně pouze sekundární drogu (včetně opiátů a amfetaminů).

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

VIROVÉ HEPATITIDY A, B, C

Virová hepatitida A

Celkový počet pouze 127 hlášených případů za rok 2002 v celé ČR potvrzuje trvale sestupný trend výskytu tohoto onemocnění (*tabulka č. 40*). Zdroje nákazy jsou zřejmě stále více omezovány – stejně jako v jiných evropských státech – účinnou ochranou vodních zdrojů, rozšiřující se kanalizační sítí a zlepšující se ochraně při výrobě a distribuci potravin.

Prakticky polovina všech případů je hlášena z Ústeckého kraje, patrně v souvislosti s letními záplavami (*tabulka č. 43*), evidovaná onemocnění se vyskytla převážně u osob z romského etnika.

Věková distribuce hlášených případů ukazuje na výraznější postižení věkových skupin 15 - 44 let, kde také nacházíme téměř 8 % osob s rizikovým chováním.

Virová hepatitida B

I nadále v uplynulém roce je možno pozorovat pokračující snižování výskytu. V roce 2002 bylo hlášeno 413 případů (v roce 2001 ještě 457 případů), mezi nimi bylo 136 osob s rizikovým chováním, z nich dokonce bylo 112 injekčních narkomanů (27,1 %). Věková distribuce virové hepatitidy B plně koresponduje s věkovou distribucí injekčních problémových uživatelů drog, nejpostiženější jsou věkové skupiny 15 – 19 let a 20 – 24 let, stále častěji se však objevují i případy v ještě starších věkových skupinách (*tabulka č. 41*).

Zvlášť výrazný výskyt tohoto onemocnění byl hlášen v Praze a v Ústeckém kraji (*tabulka č. 44*).

Celostátní zavedení povinného očkování 12letých se postupně stává strategicky i zdravotně významným.

Virová hepatitida C

Výskyt virové hepatitidy C se ve srovnání s rokem 2001 významně snížil. V roce 2002 bylo hlášeno 213 akutních hepatitid typu C (v roce 2001 to bylo 276 případů). Z nich injekční narkomani představují 127 případů, tj. 59,6 % (*tabulka č. 42*). Tato čísla budou však výrazně

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

nižší, než skutečná incidence, a to jak z důvodů obav z hospitalizace, tak i z důvodů nerozpoznané nákazy u inaparentních a aniktерických forem.

Virová hepatitida C je typickou hepatitidou injekčních narkomanů a výskyt akutních onemocnění plně koresponduje s věkovou distribucí jejich incidence a zejména prevalence, tj. postižení věkových skupin 15 – 34 let.

Nejvíce akutních hepatitid C je hlášeno z kraje Ústí nad Labem, Prahy a Středočeského kraje, nízký až nulový výskyt v několika krajích zcela jistě neodpovídá skutečnosti (*tabulka č. 45*).

Šíření virové hepatitidy C je – přes rozsáhlé možnosti výměny jehel a stříkaček – stále varující, a to zejména pro vysoký podíl inaparentních a chronických zdrojů onemocnění. Pokusy o zhodnocení situace náhodnými testy, bez souběhu s konfirmačním vyšetřením, jsou i vzhledem ke krátkodobé pozitivitě a virémii bez tvorby neutralizačních protilátek neprůkazné a zavádějící.

Porovnání hlášených případů virových hepatitid A, B a C je na *grafu č.18*. Na dalším *grafu č. 19* je zachycen podíl osob s rizikovým chováním podle věku nemocných u jednotlivých typů virových hepatitid. Na grafu č. 20 je podíl injekčních narkomanů v jednotlivých krajích ČR.

Graf č. 21 ukazuje vzájemný poměr identifikovaných injekčních narkomanů mezi nemocnými jednotlivými typy virových hepatitid. Téměř 60 % všech virových hepatitid typu C je u injekčních narkomanů.

Pravděpodobnost infekce virovými hepatitidami, a to zejména virovou hepatitidou C, u injekčních narkomanů stoupá a je v přímé závislosti na době a frekvenci injekčního užívání. To dokumentují i *tabulky č. 46* a *47*. Zatímco u nově evidovaných injekčních uživatelů drog bylo na markery virové hepatitidy C pozitivně testováno 227 osob z 959 testovaných injekčních uživatelů drog, tj. 23,7 %. Mezi všemi klienty to bylo již 894 pozitivních z celkem 2 837 testovaných injekčních uživatelů drog, tj. 31,5 %. Podobné výsledky jsou i při testování na markery hepatitidy B.

Závažné je zjištění, že zhruba 70 % nově evidovaných injekčních uživatelů drog nebylo testováno, a dokonce, že se zatím nepodařilo testovat více než polovinu ze všech injekčních uživatelů drog, kteří jsou v péči L/K center.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

VIROVÁ HEPATITIDA TYPU A
ČR - 2002

Věková skupina	Česká republika					z toho Praha				
	Celkem osob	Z toho s rizikovým chováním	% ve věk. skupině	Z toho injekční narkomani	% ve věk. skupině	Celkem osob	Z toho s rizikovým chováním	% ve věk. skupině	Z toho injekční narkomani	% ve věk. skupině
0	1									
1 – 4	14									
5 – 9	19					1				
10 – 14	8									
15 – 19	9	2	22,2	2	22,2					
20 – 24	17	6	35,3	3	17,6	3	1	33,3		
25 – 34	28	1	3,6			8	1	12,5		
35 – 44	12	1	8,3	1	8,3	1				
45 – 54	7					2				
55 – 64	6					1				
64 – 74	2									
75 +	4									
Celkem	127	10	7,9	6	4,7	16	2	12,5	0	0

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 41

VIROVÁ HEPATITIDA TYPU B
ČR - 2002

Věková skupina	Česká republika					z toho Praha				
	Celkem osob	Z toho s rizikovým chováním	% ve věk. skupině	Z toho injekční narkomani	% ve věk. skupině	Celkem osob	Z toho s rizikovým chováním	% ve věk. skupině	Z toho injekční narkomani	% ve věk. skupině
0	2									
1 – 4	2					1				
5 – 9	4									
10 – 14	1					1				
15 – 19	68	44	64,7	37	54,4	21	12	57,1	11	52,4
20 – 24	93	53	56,9	46	49,5	26	21	80,1	20	76,9
25 – 34	67	21	31,3	15	22,4	24	7	29,2	6	25,0
35 – 44	50	12	24,0	12	24,0	10	6	60,0	6	60,0
45 – 54	40	5	12,5	2	5,0	12	3	25,0	2	16,7
55 – 64	37	1	2,7			4				
64 – 74	32					6				
75 +	17					4				
Celkem	413	136	32,9	112	27,1	109	49	44,9	45	41,3

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

VIROVÁ HEPATITIDA TYPU C
ČR - 2002

Věková skupina	Česká republika					z toho Praha				
	Celkem osob	Z toho s rizikovým chováním	% ve věk. skupině	Z toho injekční narkomani	% ve věk. skupině	Celkem osob	Z toho s rizikovým chováním	% ve věk. skupině	Z toho injekční narkomani	% ve věk. skupině
0	2					1				
1 – 4										
5 – 9										
10 – 14	1									
15 – 19	55	48	87,3	44	80,0	8	7	87,5	7	87,5
20 – 24	58	48	82,8	44	75,9	8	6	75,0	5	62,5
25 – 34	59	40	67,8	32	54,2	15	10	66,7	10	66,7
35 – 44	19	9	47,4	6	31,6	3	1	33,3	1	33,3
45 – 54	5	1	20,0	1	20,0	2				
55 – 64	9	2	22,2			2	1	50,0		
64 – 74	3					2				
75 +	2					1				
Celkem	213	148	69,5	127	59,6	42	25	59,5	23	54,8

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 43

VIROVÁ HEPATITIDA TYPU A podle krajů
ČR – 2002

Kraj	Celkem	Injekční narkomani	%
Praha	16	*	*
Středočeský	7	**1**	***14,3***
Jihočeský	1	*	*
Plzeňský	2	*	*
Karlovarský	3	*	*
Ústecký	55	**5**	***9,1***
Liberecký	6	*	*
Královéhradecký	5	*	*
Pardubický	13	*	*
Vysočina	2	*	*
Jihomoravský	7	*	*
Olomoucký	5	*	*
Zlínský	4	*	*
Moravskoslezský	1	*	*
Celkem	**127**	**6**	***4,7***

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 44

VIROVÁ HEPATITIDA TYPU B podle krajů
ČR – 2002

Kraj	Celkem	Injekční narkomani	%
Praha	109	**45**	***41,3***
Středočeský	57	**13**	***22,8***
Jihočeský	16	**3**	***18,8***
Plzeňský	14	**4**	***28,6***
Karlovarský	15	**6**	***40,0***
Ústecký	71	**27**	***38,0***
Liberecký	11	**1**	***9,1***
Královéhradecký	21	**3**	***14,3***
Pardubický	8	**1**	***12,5***
Vysočina	6	*	*
Jihomoravský	15	**3**	***20,0***
Olomoucký	30	**3**	***10,0***
Zlínský	5	*	*
Moravskoslezský	35	**3**	***8,6***
Celkem	**413**	**112**	***27,1***

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 45

VIROVÁ HEPATITIDA TYPU C podle krajů
ČR – 2002

Region	Celkem	Injekční narkomani	%
Praha	42	**23**	***54,8***
Středočeský	32	**19**	***59,4***
Jihočeský	15	**6**	***40,0***
Plzeňský	5	**2**	***40,0***
Karlovarský	7	**6**	***85,7***
Ústecký	74	**53**	***71,6***
Liberecký	11	**5**	***45,5***
Královéhradecký	5	**2**	***40,0***
Pardubický	*	*	*
Vysočina	3	**1**	***33,3***
Jihomoravský	11	**4**	***36,4***
Olomoucký	2	**2**	***100,0***
Zlínský	1	**1**	***100,0***
Moravskoslezský	5	**3**	***60,0***
Celkem	**213**	**127**	***59,6***

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 46

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Vyšetření markerů virových hepatitid A, B, C u nově evidovaných injekčních problémových uživatelů heroinu a pervitinu v roce 2002

Droga		Testováno *)			Netestováno **)	
		počet injekčních uživatelů	Z toho počet pozitivních	%	počet injekčních uživatelů	% z celkových počtů
Všichni injekční uživatelé *N = 2760*	**VHA**	678	**46**	***6,8***	2082	*75,4*
	VHB	835	**74**	***8,9***	1925	*69,7*
	VHC	959	**227**	***23,7***	1801	*65,3*
Injekční uživatelé heroinu a ost. opiátů *N = 845*	**VHA**	270	**18**	***6,7***	575	*68,0*
	VHB	327	**44**	***13,5***	518	*61,3*
	VHC	369	**126**	***34,1***	476	*56,3*
Injekční uživatelé pervitinu a j. stimulancií *N = 2354*	**VHA**	566	**39**	***6,9***	1788	*76,0*
	VHB	699	**52**	***7,4***	1655	*70,3*
	VHC	806	**174**	***21,6***	1548	*65,8*

***)** Zahrnuje: „testován – pozitivní“ a „testován – negativní“

****)** Zahrnuje: “testován – výsledek neznám”; “nikdy netestován”; “neznámo, zda testován” a “neuvedeno”

Pozn.: Někteří injekční uživatelé pervitinu užívají současně injekčně i heroin a naopak. Podrobnější vysvětlení – viz text.

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 47

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Vyšetření markerů virových hepatitid A, B, C u všech injekčních problémových uživatelů heroinu a pervitinu v roce 2002

Droga		Testováno *)			Netestováno **)	
		počet injekčních uživatelů	Z toho počet pozitivních	%	počet injekčních uživatelů	% z celkových počtů
Všichni injekční uživatelé *N = 6225*	**VHA**	2059	**132**	***6,4***	4166	*66,9*
	VHB	2476	**255**	***10,3***	3749	*60,2*
	VHC	2837	**894**	***31,5***	3388	*54,4*
Injekční uživatelé heroinu a ost. opiátů *N = 2475*	**VHA**	1038	**82**	***7,9***	1437	*58,1*
	VHB	1213	**177**	***14,6***	1262	*51,0*
	VHC	1346	**527**	***39,2***	1129	*45,6*
Injekční uživatelé pervitinu a j. stimulancií *N = 5026*	**VHA**	1604	**99**	***6,2***	3422	*68,1*
	VHB	1944	**187**	***9,6***	3082	*61,3*
	VHC	2233	**671**	***30,0***	2793	*55,6*

***)** Zahrnuje: „testován – pozitivní“ a „testován – negativní“

****)** Zahrnuje: “testován – výsledek neznám”; “nikdy netestován”; “neznámo, zda testován” a “neuvedeno”

Pozn.: Někteří injekční uživatelé pervitinu užívají současně injekčně i heroin a naopak. Podrobnější vysvětlení – viz text.

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Virová hepatitida A, B, C v ČR roce 2002

Graf č. 18



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Graf č. 19

Virová hepatitida A, B, C v ČR v roce 2002
Podíl osob s rizikovým chováním podle věku



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

VIROVÁ HEPATITIDA A, B, C
ČR - 2002

Graf č. 20

Podíl injekčních narkomanů na celkovém počtu hepatitid



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Graf č. 21

Virová hepatitida A, B, C v ČR v roce 2002

Poměr injekčních narkomanů z celkového počtu hlášených virových hepatitid A, B, C



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

HIV/AIDS U INJEKČNÍCH NARKOMANŮ

Pro úplnost výroční zprávy zařazujeme i informace o dalším zdravotním ukazateli důsledků drogových závislostí, kterým je výskyt HIV/AIDS u injekčních narkomanů. Zdrojem informací je Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS v SZÚ.

Ke dni 31.12.2002 bylo v ČR evidováno 601 HIV pozitivních osob (*tabulka č. 48*). Z toho bylo 22 případů u injekčních uživatelů drog. Koncem roku bylo v ČR dále evidováno 163 případů AIDS, z toho ve dvou případech se jednalo o injekční uživatele drog.

V průběhu roku 2002 tedy byl zachycen pouze jeden případ HIV u injekčního uživatele drog a evidováno dalších 7 případů, které spadají do kategorie "homo/bisexuál a injekční uživatel drog“, kde nelze jednoznačně určit způsob přenosu infekce.

Při interpretaci uváděných výsledků vyšetření na HIV nejsou z epidemiologického hlediska ani tak důležité velice nízké počty pozitivních osob, jako skutečnost, že více 2/3 nově zachycených injekčních uživatelů drog buď nebylo nikdy testováno, nebo je neznámo, zda byli testováni, a nebo údajně sice testováni byli, ale výsledek testu není znám (*tabulka č. 49*).

Výsledky testování na HIV zjišťované u všech léčených injekčních uživatelů drog v roce 2002 jsou jen nepatrně příznivější, stále zůstává zhruba 55 % injekčních uživatelů drog netestováno či s neznámým výsledkem provedeného testu (*tabulka č. 50*).

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 48

Hlášené případy HIV pozitivní a případy AIDS – ČR*)

ROK	HIV +		Z toho AIDS	
	Celkem	Z toho injekční uživatelé drog	Celkem	Z toho injekční uživatelé drog
do roku 1990	108	0	21	0
1991	12	1	2	0
1992	24	0	9	0
1993	27	1	15	0
1994	38	2	12	2
1995	40	2	13	0
1996	50	1	19	0
1997	63	3	20	0
1998	31	3	8	0
1999	50	0	16	0
2000	58	5	14	0
2001	51	3	6	0
2002	49	1	8	0
Kumulativně	**601**	**22**	**163**	**2**

Pozn.: Injekční uživatelé HIV pozitivní jsou pouze muži.

*) Dalších 7 případů, z nichž 1 již vykazuje manifestní AIDS, spadá do kategorie "homo/bisexuál a injekční uživatel drog", kde nelze jednoznačně určit způsob přenosu

Zdroj: Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS v SZÚ

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 49

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Vyšetření HIV u nově zachycených injekčních problémových uživatelů heroinu a pervitinu

Droga	Testován - pozitivní		Testován - negativní		Testován – výsledek neznám		Nikdy netestován		Neznámo zda testován		Neuvedeno		Celkem injekčních uživatelů
	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	
Všichni injekční uživatelé	**3**	*0,1*	865	*31,3*	120	*4,3*	887	***32,1***	843	***30,5***	42	*1,5*	**2760**
Injekční uživatelé heroinu a ost. opiátů	**3**	***0,4***	307	*36,3*	41	*4,9*	185	***21,9***	288	***34,1***	21	*2,5*	**845**
Injekční uživatelé pervitinu a ost. stimulancií	**1**	***0,0***	738	*31,4*	104	*4,4*	805	***34,2***	680	***28,9***	26	*1,1*	**2354**

Pozn.: Někteří injekční uživatelé pervitinu užívají současně injekčně i heroin a naopak. Podrobnější vysvětlení – viz text.

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 50

INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu ČR - 2002

Vyšetření HIV u všech injekčních problémových uživatelů heroinu a pervitinu

Droga	Testován - pozitivní		Testován - negativní		Testován – výsledek neznám		Nikdy netestován		Neznámo zda testován		Neuvedeno		Celkem injekčních uživatelů
	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	
Všichni injekční uživatelé	10	***0,2***	2647	*42,5*	309	*5,0*	1403	***22,5***	1773	***28,5***	83	*1,3*	**6225**
Injekční uživatelé heroinu a ost. opiátů	**5**	***0,2***	1222	*49,4*	145	*5,9*	317	***12,8***	734	***29,7***	52	*2,1*	**2475**
Injekční uživatelé pervitinu a ost. stimulancií	**7**	***0,1***	2113	*42,0*	249	*5,0*	1252	***24,9***	1357	***27,0***	48	*1,0*	**5026**

Pozn.: Někteří injekční uživatelé pervitinu užívají současně injekčně i heroin a naopak. Podrobnější vysvětlení – viz text.

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

INFORMACE O VÝMĚNNÉM PROGRAMU STŘÍKAČEK A JEHEL ZA ROK 2002

Cílem této informace není vyjadřovat se k podstatě této činnosti ani hodnotit její účinnost. Předkládáme dostupné údaje o rozsahu výměnného programu v jednotlivých krajích.

Celkem bylo v roce 2002 evidováno zhruba **1 410 000** injekčních stříkaček a jehel vydaných **v rámci výměnného programu.** Hlášení přišla ze všech významnějších L/K center. Poprvé jsme evidovali kromě výměn v samotných léčebně / kontaktních centrech také počet výměn uskutečněných v terénních programech. Evidovány byly výměnné programy probíhající v **69 centrech** a v rámci **48 terénních programů,** které působí většinou pod záštitou určitého nízkoprahového centra, někdy však také samostatně.

Počet injekčních setů vydaných přímo **v L/K centrech** byl asi **910 000**, o téměř 260 000 menší než v roce 2001. Tento významný pokles (23 %) lze přičíst na vrub zejména srpnovým záplavám, které vyřadily některá L/K centra na čas z provozu (například byla mimo provoz dvě největší pražská nízkoprahová centra - DROP IN na měsíc a KC SANANIM až do února 2003). Některá centra byla postižena rovněž organizačními a finančními problémy. Počet výměn hlášených **z terénních programů** byl necelých **500 000**. Z předchozích let tuto evidenci nemáme.

Celkově bylo tedy v ČR **v rámci výměnného programu** vydáno nejméně **1 400 000 kusů** injekčních setů. Podle dotazníkové studie „Lékárny“, provedené v rámci „Projektu analýzy dopadů novelizace drogové legislativy“ bylo v ČR v letech 1998 – 2000 získali injekční uživatelé drog každoročně dalších asi **900 000 kusů přímým nákupem v lékárnách.**[3] Tento prodej je po území ČR rozložen podstatně rovnoměrněji než výměnný program. Celkem je tedy možné odhadnout, že **za uplynulý rok měli injekční uživatelé drog k dispozici asi 2 300 000 kusů sterilních stříkaček a jehel.**

Frekvence injekčního užívání se u jednotlivých uživatelů drog velmi liší. *Z tabulky č. 30* vyplývá, že zhruba polovina všech evidovaných uživatelů heroinu jej užívá alespoň jedenkrát denně. U uživatelů pervitinu je to pouze asi 1/6, většinou se jedná o užívání 2 – 6 x týdně nebo jenom 1x týdně a méně často. U injekčních uživatelů, kteří tvoří asi 80 % z uživatelů těchto drog, se rozložení frekvencí užití neliší. Průměrná denní spotřeba jehel na

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

jednoho injekčního uživatele drog v ČR nebyla zatím upřesněna [3]. **Vycházíme-li teoreticky z potřeby jedné sterilní stříkačky/jehly denně, uvedený počet 2,3 miliónu kusů by stačil asi pro 6 300 injekčních uživatelů drog.**

V kapitole „Odhad prevalence problémových uživatelů drog“ usuzujeme, že v naší zemi existuje asi 28 800 injekčních uživatelů drog (viz *tabulka č. 38*). Předpokládá se, že více než 50 % z nich využívá výměnné programy. Z toho je zřejmé, že výměnné programy spolu s prodejem v lékárnách **celkovou potřebu plně nepokrývají.**

Územní pokrytí je nadále velmi **nerovnoměrné.** V Praze je realizováno 57 % výměn, 17 % v Ústeckém kraji, necelých 10 % v Jihomoravském kraji a ve všech ostatních 11 krajích dohromady pouze 16 %. Přepočteme-li počet vyměněných injekčních setů na jednoho evidovaného injekčního uživatele drog za rok, vychází nám v Praze 814 kusů na jednoho klienta, v Ústeckém kraji 190 ks, v Jihomoravském 150 ks a ve všech ostatních krajích v průměru 72 ks na jednoho klienta.

Celkem je výměnný program uskutečňován **v 62 z 86 bývalých okresů a pražských obvodů**, přičemž některé terénní programy pracují i na území dalších, sousedních okresů či pražských obvodů. Územní pokrytí krajů podle dostupných údajů je následující:

Praha	7 obvodů z 10
Středočeský	6 okresů z 12
Jihočeský	7 okresů ze 7
Plzeňský	2 okresy ze 7
Karlovarský	3 okresy ze 3
Ústecký	7 okresů ze 7
Liberecký	3 okresy ze 4
Královéhradecký	2 okresy z 5
Pardubický	2 okresy ze 4
Vysočina	5 okresů z 5
Jihomoravský	5 okresů ze 7
Olomoucký	3 okresy z 5
Zlínský	4 okresy ze 4
Moravskoslezský	6 okresů ze 6

[3] Mravčík V, Zábranský T: Prevalenční odhad problémových uživatelů drog v ČR – syntéza dostupných dat. Adiktologie 1, 2001, Supplementum č. 1 , s. 22-43.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Ze **srovnání s předchozími lety** je patrné, že počet výměn a počet pracovišť, které výměnný program provádějí, se zvyšoval zejména do roku 2000. Pokles v roce 2002 je komentován výše.

	1998	1999	2000	2001	2002
L/K centra - počet kusů	490 000	850 000	1 150 000	1 180 000	910 000
Terénní programy – počet kusů	*	*	*	*	500 000
Počet hlásících L/K center	35	74	77	78	69
Počet hlásících terénních programů	*	*	*	*	48

Přehled o výměnném programu v roce 2002

Kraj – okres	L/K centrum	Počet vyměněných kusů 2001	2002 v L/K centru	2002 v terénu	2002 celkem
	PRAHA				
Praha 1	DROP IN	**215 492**	156 947	138 546	**295 493**
Praha 2	ČČK Hlavní nádraží	**87 800**	79 620	*	**79 620**
	Šance	*	*	5 200	**5 200**
Praha 4	ESET HELP	**9 373**	20 975	*	**20 975**
	Streetworker ÚMČ Praha 12	**1 622**	*	1 630	**1 630**
Praha 5	HOST	*	*	3 108	**3 108**
Praha 7	SANANIM, K-centrum	**367 035**	241 173	*	**241 173**
Praha 9	SANANIM, terénní programy	*	*	166 085	**166 085**
Praha 10	Centrum pro závislé Iasis	**605**	730	*	**730**
Celkem	**5 center, 5 terénních programů**	**681 927**	499 445	314 569	**814 014**
	STŘEDOČESKÝ				
Benešov	K-centrum	**1 424**	573	*	**573**
Beroun	OAT Medicentrum, MUDr. Brychta	**32**	21	*	**21**
	SPONTE, Králův Dvůr	**389**	157	*	**157**
Kladno	Centrum prevence a krizové pomoci	**1 700**	484	*	**484**
Kolín	Arché	**180**	*	*	*
	Okresní nízkoprahové centrum	**563**	*	*	*
Kutná Hora	AT ordinace, MUDr. Riesel	**76**	*	*	*
	Streetworker OÚ	**182**	*	*	*
Mělník	Ordinace AT, MUDr. Hampl	**61**	45	*	**45**
	K-centrum	**13**	*	*	*
	Streetworker Kralupy n. Vltavou	**30**	*	*	*
Mladá Boleslav	K-centrum	**4 981**	3 440	*	**3 440**
Nymburk	K-centrum Velké Valy	**2 836**	6 123	*	**6 123**
Rakovník	K-centrum	**350**	*	*	*
Celkem	**7 center**	**12 817**	10 843	0	**10 843**

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Kraj – okres	L/K centrum	Počet vyměněných kusů 2001	2002 v L/K centru	2002 v terénu	2002 celkem
JIHOČESKÝ					
České Budějovice	OHS	**0**	1 511	*	**1 511**
	K-centrum	**19 304**	7 677	*	**7 677**
	K-centra Strakonice a Prachatice, terén	***)**	*	2 731	**2 731**
Č.Krumlov	K-centrum	**169**	97	*	**97**
Jindřichův Hradec	OHS	**0**	90	*	**90**
	K-centrum Citadela, Třeboň	***)**	161	*	**161**
Písek	Krizové centrum Arkáda	**1 580**	2 734	*	**2 734**
Prachatice	K-centrum	**3 316**	1 348	*	**1 348**
Strakonice	K-centrum	**1 857**	4 151	*	**4 151**
Tábor	Auritus	**4 147**	1 252	11	**1 252**
Celkem	**9 center, 2 terénní programy**	**30 373**	19 021	2 742	**21 763**
PLZEŇSKÝ					
Klatovy	Centrum sociální prevence	**1 736**	2 209	*	**2 209**
Plzeň	Centrum protidrogové prevence	**19 690**	18 332	1 635	**19 967**
Celkem	**2 centra, 1 terénní program**	**21 426**	20 541	1 635	**22 176**
KARLOVARSKÝ					
Cheb	K-centrum Kotec	**2 032**	949	251	**1200**
	OHS		1 504	*	**1 504**
Karlovy Vary	K-centrum	**8 594**	8 577	3 924	*
Sokolov	OHS	**1 139**	1 448	*	**1 448**
Celkem	**4 centra, 2 terénní programy**	**11 765**	12 478	4 175	**16 653**
ÚSTECKÝ					
Děčín	K-centrum Děčín	**27 485**	14 469	458	**14 927**
	K-centrum Rumburk	**841**	1 048	31	**1 079**
	K-centrum Communio, Varnsdorf	**19**	*	37	**37**
Chomutov	K-centrum Kadaň	**7 086**	12 068	1 242	**13 310**
	K-centrum Chomutov	**33 267**	22 983	14 440	**37 423**
Litoměřice	K-centrum Litoměřice	**7 475**	8 350	*	*
	IK centrum Roudnice n. L., terén	*	*	8 797	**8 797**
Louny	K-centrum Schody, Žatec	**1 431**	4 128	492	**4 620**
Most	K-centrum	**69 619**	33 763	32 996	**66 759**
Teplice	Kontaktní krizové centrum	**20 351**	8 522	4 470	**12 992**
Ústí nad Labem	K-centrum	**81 960**	69 042	1 305	**70 347**
	Sokrates	**1 667**	*	1 390	**1 390**
	Sokrates 2	**122**	*	247	**247**
Celkem	**9 center, 12 terénních programů**	**251 323**	174 373	65 905	**240 278**

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Kraj – okres	L/K centrum	Počet vyměněných kusů 2001	2002 v L/K centru	2002 v terénu	2002 celkem
LIBERECKÝ					
Česká Lípa	K-centrum	**3 770**	1 569	1 476	**3 045**
Jablonec n. N.	ARX, krizové centrum	**4 911**	4 746	125	**4 871**
Liberec	K-centrum	**2 977**	4 664	643	**5 307**
Celkem	**3 centra, 3 terénní programy**	**11 658**	10 979	2 244	**13 223**
KRÁLOVÉHRADECKÝ					
Hradec Králové	Laxus	**7 868**	13 733	5 660	**19 393**
Trutnov	RIAPS	**1 765**	2 627	1 014	**3 641**
Celkem	**2 centra, 2 terénní programy**	**9 633**	16 360	6 674	**23 034**
PARDUBICKÝ					
Pardubice	K-centrum vč. terénu*)	**10 019**	22 414*)	*)	**22 414**
Ústí nad Orlicí	EX-IT	**304**	*	292	**292**
Celkem	**1 centrum, 2 terénní programy**	**10 323**	22 414	292	**22 706**
VYSOČINA					
Havlíčkův Brod	K-centrum Fokus	**569**	253	*	**253**
Jihlava	K-centrum	**1 527**	5 820	200	**6 020**
Pelhřimov	K-centrum VIA	**782**	943	*	**943**
Třebíč	K-centrum	**646**	867	823	**1 690**
Žďár nad Sáz.	Klub Spektrum	**111**	1 637	111	**1 748**
Celkem	**5 center, 3 terénní programy**	**3 635**	9 520	1 134	**10 654**
JIHOMORAVSKÝ					
Blansko	Prevcentrum Ulita	**6 691**	*	6 577	**6 577**
Brno - město	Podané ruce	**22 030**	24 302	33 300	**57 602**
Brno – venkov	K-centrum Ivančice	**19**	*	*	*
Břeclav	K-centrum	**24 004**	8 893	25 064	**33 957**
Hodonín	K-centrum Hodonín	**8 019**	10 010	10 810	**20 820**
	K-centrum Kyjov	**8 687**	9 963	2 813	**12 776**
Znojmo	K-centrum Netopeer,		*	1 834	**1 834**
Celkem	**4 centra, 6 terénních programů**	**69 450**	53 168	80 398	**133 566**

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Kraj – okres	L/K centrum	Počet vyměněných kusů 2001	2002 v L/K centru	2002 v terénu	2002 celkem
OLOMOUCKÝ					
Jeseník	K-centrum Srdíčko	**325**	*	*	*
Olomouc	K-centrum Walhalla, Olomouc	**4 689**	9 965	173	**10 138**
	K-centrum Walhalla, terén Šternberk	*	*	605	**605**
	P-centrum	**78**	*	*	*
Přerov	K-centrum Kappa, Hranice	**4 789**	525	315	**6521**
	K-centrum Kappa, Přerov	**6 693**	5 681		
Šumperk	K-centrum Domus	**984**	1 126	*	**1 126**
Celkem	**4 centra, 3 terénní programy**	**17 567**	17 297	1 093	**18 390**
ZLÍNSKÝ					
Kroměříž	K-centrum Plus vč. terénu*)	**5 299**	10 656*)	*)	**10 656**
Uher. Hradiště	K-centrum	**846**	1 741	689	**2 430**
Vsetín	Drug Azyl - centrum Klíč	**2 458**	1 325	*	**1 325**
Zlín	K-centrum Haus	**3 021**	3 591	1 150	**4 741**
Celkem	**4 centra, 3 terénní programy**	**11 624**	17 313	1 839	**19 152**
MORAVSKOSLEZSKÝ					
Bruntál	K-centrum Krnov	**7 933**	5 049	2 199	**7 248**
Frýdek-Místek	K-centrum Renarkon	**5 324**	7 248	*	**7 248**
Karviná	AVE, Český Těšín	**220**	231	*	**231**
	Poradna AIDS/drogy Karviná	**19**	*	*	*
	K-centrum NET, Bohumín	**395**	491	*	**491**
	K-centrum NET Orlová	**411**	699	*	**699**
	Centrum drogové pomoci, Havířov	**1 856**	2 752	*	**2 752**
	K-centrum NET, Karviná	**88**	1 759	*	**1 759**
Nový Jičín	K-centrum Nový Jičín, terén Příbor, Kopřivnice	**5 381**	138	4 201	**4 339**
Opava	K-centrum Pod slunečníkem	**3 221**	1 922	70	**1 992**
Ostrava	K-centrum	**10 642**	8 162	8 684	**16 846**
Celkem	**10 center, 4 terénní programy**	**35 490**	28 451	15 154	**43 605**
ČR CELKEM	**V roce 2002 69 center, 48 terén. programů**	**1 179 011**	**912 495**	**497 562**	**1 410 057**

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

INTOXIKACE DROGAMI (VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ÚMRTÍ)

Nepřímým indikátorem zdravotní závažnosti užívání drog je sledování intoxikací v souvislosti s užitím drogy – jsou zjišťována data o jejich frekvenci, podílu jednotlivých drog na evidovaných případech i o charakteristikách intoxikovaných osob.

Do zpracování dat se v období roku 2001 prvně promítlo nové státoprávní uspořádání, takže data za rok 2002 jsou v pořadí druhá ve stejných krajích. Oproti předchozímu období došlo k poklesu celkového počtu zachycených intoxikací o 15,5 % (z 1 183 v roce 2001 na 1 000 zachycených intoxikací), což ovšem neznamená pokles jejich výskytu, ale souvisí to se sentinelovým sběrem dat.

Mezi šest krajů s nejvíce evidovanými případy intoxikací patří stejné kraje, jako v roce předchozím, pouze se změnilo pořadí některých (*viz tabulka č. 51*):

1. Praha: 267 případů – i přes pokles počtu intoxikací se Praha po roce opět dostává do čela v rámci ČR před Moravskoslezský kraj
2. Moravskoslezský kraj: 256 případů
3. Ústecký kraj: 231 případů
4. Plzeňský kraj: 73 případů
5. Středočeský kraj: 44 případů
6. Liberecký kraj: 43 případů

V ostatních krajích bylo evidováno 12 – 22 případů intoxikací, v Karlovarském kraji 2 případy, Královéhradecký a Jihomoravský kraj nevykázaly žádný případ intoxikace v souvislosti s užitím drogy, i když z jiných statistik a zdrojů je známa velká obliba stimulačních drog (zejména pervitinu) v Jihomoravském kraji.

Dlouhodobě z hlediska trendů se dají hodnotit údaje za tři oblasti – hlavní město, sever Čech a sever Moravy (v dnešním uspořádání Praha, Moravskoslezský a Ústecký kraj). Z ostatních oblastí není sběr a hlášení dat systematické. Dokazuje to i letošní struktura údajů, kdy výše uvedené tři kraje hlásí 75,4 % veškerých zachycených intoxikací, ve zbylých 11 krajích je pouze 24,6 %.

Ve stejné tabulce je i přehled, která zdravotnická zařízení hlásila v kterém kraji intoxikace v souvislosti s užitím drogy. Rozdíly podle krajů dokazují i nestejná kritéria zařazování jednotlivých případů. Nejvíce hlášených intoxikací (v celé ČR 449) je z interních oddělení a jednotek intenzivní péče, což odpovídá pojetí intoxikace jako „non-fatal emergency“, tedy nějaké somatické komplikaci, která doprovází abúzus drog. Celkem

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

119 případů nahlásila shodně psychiatrická a dětská oddělení, přičemž psychiatrie jako zdroj hlášení je pouze v Moravskoslezském kraji (104) a v Ústeckém kraji (15). V Praze jedno detoxikační a detoxifikační oddělení odmítlo poskytovat data s odůvodněním, že u klientů tohoto oddělení jde výhradně o psychiatrickou problematiku. Ale domníváme se, že např. toxická psychóza by do dat měla být zahrnuta. Data jsou však hlásícími zařízeními poskytována výhradně dobrovolně a není možné jejich poskytování nijak vynutit. Dalších 118 případů hlásí v celorepublikovém přehledu ARO, 108 záchranná služba. Pracoviště typu centrálního příjmu jsou zatím výhradně v pražských fakultních nemocnicích (FN Královské Vinohrady, FN Motol) a vykázaly 63 intoxikací. Na druhé straně jediné hlášení přišlo z pracoviště LSPP a žádné ze soudního lékařství (která by měla registrovat úmrtí následkem užití drogy!). Mezi kraji má nejširší škálu zdrojů Ústecký kraj (ARO, záchranná služba, interny a JIP, psychiatrie, dětská oddělení a 7 jiných typů ZZ), zde by tedy data měla být nejúplnější. V Praze chybí údaje od záchranné služby (pouhé 4 případy zcela jistě neodpovídají realitě v ulicích) a z psychiatrií (žádné hlášení), v Moravskoslezském kraji jsou zdroje také poměrně široce rozloženy (ARO, interny a JIP, již zmíněná psychiatrická oddělení, dětská oddělení, zcela chybí jakýkoliv údaj od záchranné služby).

Tabulka č. 52 a *graf č. 22* zachycuje podíl jednotlivých drog/skupin drog a jejich oblibu mezi intoxikovanými muži a ženami. Opiáty celkově tvoří pětinu zachycených intoxikací (20,1 %), heroin samotný 17,6 %), což je oproti loňskému období pokles o 7,2 % (u heroinu o 6,5 %) a skupina intoxikací těmito látkami se dostala na třetí místo. Intoxikace stimulačními látkami oproti minulému roku vzrostly, jak v datech za hlavní město, tak v ČR na 20,9 %, přičemž pervitin/amfetamin tvoří 20,3 % případů a tvoří vyšší podíl než heroin spolu s opiáty; jako skupina drog jsou stimulancia na místě druhém. Na prvním místě jsou jako původci intoxikací v souvislosti s užitím drogy hypnotika, sedativa, barbituráty a benzodiazepiny - celkově 22,6 %. Nicméně podíl těchto tří skupin je velmi vyrovnaný a procentuální rozdíly jsou zanedbatelné. Podíl neurčených a neznámých drog činí 19,2 %, tedy téměř celou pětinu, oproti roku 2001 podíl mírně vzrostl. Téměř na dvojnásobek (z 5,3 % na 10,1 % se zvýšily intoxikace kanabinoidy (v Praze marihuana/hašiš zaznamenaly vzestup ještě vyšší). Došlo k mírnému poklesu u toluenu a rozpustidel.

Při porovnání rozdílů mezi pohlavími registrujeme celkem 58,9 % mužů a 41,1 % žen, podíly jsou téměř shodné s loňskými. U heroinu se zvýšil podíl intoxikací žen - zatímco v předchozím roce bylo mezi intoxikovanými heroinem 73 % mužů a 27 % žen, v roce 2002 je intoxikací mezi muži 66,5 % a 33,5 % u žen. Také u intoxikací pervitinem stoupl ve srovnání s rokem 2001 podíl žen, i když výrazně převažují muži – 69,1 % muži a 30,9 %

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

ženy. Extáze se naopak z téměř vyrovnaného podílu mužů a žen přesunula výrazněji ve prospěch žen (75 %, ale jde o malé počty případů). Intoxikace marihuanou jsou z více než tří čtvrtin (76,5 %) záležitostí mužů. Halucinogeny syntetickými (2 případy) nebo přírodními (7 případů) byli intoxikováni výhradně muži, rozpustidly převážně muži (85,5 % oproti 15,5 % žen).

Počet osob, které kombinují užití více psychoaktivních látek vzrostl v roce 2002 v ČR z 32,7 % na 40,2 % (*tabulka č. 53*). Kombinace tří drog byla v roce 2002 nalezena u 95 osob, tedy 9,5 %, čtyři látky u 2,6 % - i tato čísla se zvýšila. Jako tradičně je nejčastější sekundární drogou alkohol ve 176 případech, následuje jej skupina sedativa/hypnotika/barbituráty /benzodiazepiny celkem se 113 případy užití jako sekundární látky. Na třetím místě je skupina neurčených drog a léků (90 osob) a neznámé látky (22 osob). Stimulační látky byly užity v 72 případech, o polovinu méně - tedy v 36 marihuana. Z frekventovaných drog bývá jako nejméně častá sekundární droga užit heroin. Mužů kombinujících drogy je v souboru 57 % a žen 43 %, rozdíly ve struktuře drog užitých v kombinaci se v rozložení podle pohlaví podstatně neliší od spektra u základní drogy.

Tabulka č. 54 poskytuje přehled o skupinách drog, které byly příčinou intoxikací v jednotlivých krajích. Častější výskyt intoxikací heroinem nacházíme opakovaně pouze ve třech oblastech, tak jako již v minulém roce: v Praze (86 případů), v Ústeckém kraji (71 případů) a Moravskoslezském kraji (30 případů). Sporadický výskyt intoxikací (od 1do 8 případů) nacházíme ještě ve středních a jižních Čechách, v Plzeňském a Olomouckém kraji. Velmi podobné je regionální rozložení intoxikací pervitinem a ostatními stimulancii, pouze v Moravskoslezském kraji stimulancia převažují počtem výrazně nad opiáty. Praha hlásí 82 intoxikací stimulačními látkami, Ústecký kraj 40, Moravskoslezský 65. Ojedinělé intoxikace (opět počet 1 – 8 intoxikací) jsou zachyceny ještě v krajích: Středočeském, Plzeňském, Libereckém, Olomouckém, Zlínském a na Vysočině. Kanabinoidy jako příčinu intoxikace nacházíme kromě Prahy ještě v Ústeckém kraji (13 případů) a Moravskoslezském (25 případů) a Středočeském kraji (9 případů), jinde opět ojediněle. Drogou s nejpočetnějším výskytem intoxikací ve většině krajů jsou sedativa a hypnotika - vyskytují se ve všech krajích, které hlásily alespoň nějakou intoxikaci.

V dalších dvou tabulkách nacházíme rozložení podle věkových skupin a pohlaví *(tabulka č. 55)* a meziroční změny v těchto skupinách *(tabulka č. 56*), *graf č. 23* zachycuje podíly věkových skupin intoxikovaných osob. Celkově poklesl počet evidovaných intoxikací v souvislosti s užitím drogy o 15,5 %.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Mezi intoxikovanými opiáty a stimulancii stoupá počet případu se zvyšujícím se věkem, ale u obou skupin drog je nejvyrovnanější poměr mužů a žen mezi 15 – 19letými (u stimulancií dokonce dívky převažují nad muži), ve vyšších věkových skupinách s věkem se podíl žen oproti mužům snižuje. V nejmladší skupině do 15 let jsou 2 intoxikované dívky u heroinu a 2 chlapci u pervitinu. Kanabinoidy užívají častěji muži, nejvyšší podíl žen je ve skupině 15 – 19letých, se stoupajícím věkem podíl žen klesá. U sedativ, hypnotik, ale i jiných drog a léků je ve většině věkových skupin převaha žen nad muži, s výjimkou skupiny 20 – 24 let, kde je mezi intoxikovanými sedativy a hypnotiky 60 % mužů a u intoxikací jinými drogami a léky je poměr obou pohlaví vyrovnaný, stejně jako u hypnotik a sedativ ve skupině 25 – 39 let. Halucinogeny a rozpustidla jsou především doménou mužů.

Zajímavým zjištěním je, že v obou nejmladších věkových skupinách je větší procento žen ze všech intoxikovaných žen, než kolik je podíl příslušné věkové skupiny ze všech intoxikovaných. Mužů do 15 let ze všech mužů je 2,7 %, žen ze všech žen 3,2 %, ve skupině 15 – 19 let je mužů 17,8 %, žen 26,8 %.

Zatímco heroin mezi lety 2000 a 2001 vykázal vzestup téměř o třetinu, v následujících letech 2001 a 2002 došlo k poklesu o celkem 32,3 %. Jediné dvě skupiny drog, u nichž se počet intoxikací od roku 2001 zvýšil, jsou stimulační látky (o 12,4%) a kanabinoidy (60,3%). U pervitinu se pravděpodobně jedná o opuštění tradiční domácí výroby a zneužívání v partách tak, jak to bývalo v minulosti, zatímco dnes dochází k organizaci výroby a jejímu propojení s organizovaným zločinem včetně distribuce a exportu této drogy. U kanabinoidů jde pravděpodobně o dovoz (a také prodej) speciálně šlechtěných odrůd marihuany s daleko vyšším obsahem THC ze zahraničí (Holandsko).

V datech za celou ČR došlo k poklesu počtu případů intoxikací v souvislosti s užitím drogy **ve všech** věkových skupinách; skupina 25-39 let je opět nejpočetnější, stejně jako byla v loňském roce. Nejmenší pokles zaznamenaly naopak obě nejstarší věkové skupiny (40 a více let o 8,1 %, 25 – 39 let o 9,9 %). I v celorepublikových datech lze pozorovat stárnutí osob, u nichž dochází k projevům intoxikace v souvislosti s užitím drogy. Mezi zajímavé posuny uvnitř jednotlivých skupin drog patří vzestup intoxikací opiáty ve skupinách od 25 - 39 let (o 2,5 %) a zejména nad 40 let (o 60 %), v ostatních věkových skupinách je zaznamenán pokles. Dalším zjištěním je vzestup intoxikací pervitinem u skupiny 20 - 24 let o 27,9 % a u skupiny nad 40 let o plných 183,3 %! Kanabinoidy vykazují zvýšený počet intoxikací ve všech věkových skupinách, avšak nárůst se postupně zvyšuje s věkem až do 39 let (ve skupině 15 - 19 let o 27,8 %, v následující skupině do 24 let o 66,7 % a do 39 let o

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

175 %). Bude zajímavé sledovat v dalších letech, zda stárnutí populace intoxikovaných uživatelů drog bude pokračovat.

V ČR byl zjištěn u 50,9 % případů intoxikací v souvislosti s užitím drogy opakovaný abúzus *(Tabulka č. 57.)*. První kontakt s drogou je udáván ve 22,5 % případů, ve 26,6 % případů nebylo možné frekvenci užití drogy zjistit. Převažující opakované užití drogy nacházíme u heroinu (82,4 % z intoxikovaných heroinem), ostatních opiátů (88,9 %), pervitinem (80,6 %), toluenem (79,5 %), amfetaminem (66,7 %) a jinými rozpustidly (63,2 %). U drog rizikových (heroin, pervitin) nebo výrazně nebezpečných (rozpustidla) tedy převažuje při intoxikacích v souvislosti s užitím drogy opakované užití.

Tabulka č. 58 informuje, jakým převažujícím způsobem intoxikovaní drogu dostali do organismu. Injekční - nejrizikovější aplikaci nacházíme celkem ve 32,4 %. Stejně jako v minulých letech nacházíme výraznou převahu injekční aplikace u nejrizikovějších (tzv. „tvrdých“) drog – heroinu (v 93,8 %), pervitinu (v 72,8 % případů). U intoxikací pervitinem nacházíme všechny způsoby aplikace drogy, mezi způsoby aplikace u intoxikací heroinem chybí jedině inhalační cesta. Ze skupiny rozpustidel nacházíme jako jediný způsob aplikace u toluenu inhalaci, u „jiných rozpustidel“ je častější požití než inhalace – zde se jedná o pijáky ironu. U skupiny kanabinoidů přibývá intoxikací následkem požití této drogy – v 84,7 % sice intoxikovaní drogu kouřili, avšak ve 14,3 % ji požili.

Mezi ženami aplikovalo drogu vedoucí k intoxikaci injekčně celkem 25,1 % ze všech žen, 37,5 % mužů ze všech mužů. U intoxikovaných žen převládalo požití drogy, tento způsob aplikace drogy je jediný, kde převažují intoxikované ženy nad muži.

Předávkování vedlo k intoxikaci v 75,7 % případů registrovaných intoxikací, jiná určená diagnóza se objevila u 15,5 %, bez určení příčiny urgentního stavu je zařazeno 8,8 % intoxikovaných (*tabulka č. 59)*. Dominující je předávkování zejm. u barbiturátů, beznodiazepinů, sedativ, hypnotik, jiných drog a léků (83,5 % - 93,8 %), ale i u extáze a hašiše (100 %, ale pouze 4, resp. 3 případy), kodeinu (90 % případů). Intoxikace heroinem byly spojeny s předávkováním v 76,1 % případů, pervitinem u 60,2 % případů, u toluenu v 64,1 % případů a u jiných rozpustidel dokonce v 78,9 % případů. Jiné diagnózy vyvolaly urgentní stav nejčastěji u intoxikací pervitinem, dále heroinem a marihuanou, za pozornost stojí i oba případy intoxikací v souvislosti s užitím LSD, které oba spadají do této kategorie postižení intoxikované osoby.

Ze všech intoxikovaných osob udává 91,2 % osob bydliště stálé, 2,7 % přechodné a 2,0 % udává, že trvalou adresu nemá (bezdomovec) – *tabulka č. 60*. Do této skupiny patří

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

8 případů osob intoxikovaných amfetaminem/pervitinem, dalších 8 osob bez bydliště zneužívá toluen a/nebo rozpustidla. U ostatních drog bylo registrováno po 1 bezdomovci u intoxikace heroinem, marihuanou, benzodiazepiny a neurčenou drogou.

Mezi osobami evidovanými pro intoxikaci v souvislosti s užitím drogy bylo pravidelně zaměstnaných nebo navštěvujících školu 22,2 %, nezaměstnaných nebo pouze s příležitostným zaměstnáním 23 %. Tento údaj však nebylo možné zjistit u 42,3 % osob. Nadpoloviční podíl nezaměstnaných je u intoxikovaných toluenem – 51,3% osob a amfetaminem – 66,7 % osob. Celkové výsledky jsou ale zkreslené vysokým počtem nepřesných údajů nebo malými počty případů u jednotlivých drog (*tabulka č. 61)*.

V roce 2002 byla evidována pouze 3 úmrtí v souvislosti s intoxikací užitím drogy, což jistě neodpovídá celkové realitě. Z toho bylo 1 úmrtí následkem intoxikace pervitinem, 1x benzodiazepinem a 1x „jinou drogou, lékem“. Tyto případy za rok 2002 nelze hodnotit. V minulých letech se nejčastěji objevovala úmrtí spojená s předávkováním heroinem a toluenem, což odpovídalo alespoň klinickým zkušenostem.

Závěry a pozorované trendy:

- celkový pokles intoxikací hlášených z ČR; jde však o sentinelový systém sběru hlášení, tedy snížení počtu hlášených případů nemusí odpovídat realitě za celou ČR
- mezi kraji se na první místo opět vrátilo hlavní město
- ve skupinách drog jsou na prvním místě hypnotika/sedativa/benzodiazepiny…, na druhém místě je pervitin a ostatní stimulační drogy, které zaznamenaly zvýšený počet i podíl z intoxikací, zatímco u heroinu na místě třetím došlo k poklesu
- výrazný vzestup zaznamenaly intoxikace kanabinoidy
- u intoxikací je častěji než v předchozím roce zjištěna kombinace dvou a více psychoaktivních látek (včetně alkoholu)
- intoxikace tzv. tvrdými drogami jsou ve větším počtu hlášeny pouze ze tří oblastí – z Prahy, z Ústeckého kraje a z Moravskoslezského kraje
- intoxikace heroinem převažují v Praze a na severu Čech; na severu Moravy je více intoxikací stimulačními drogami
- z dat je patrné stárnutí souboru intoxikovaných
- u tzv. tvrdých drog přetrvává převažující injekční aplikace
- počet, příčiny a kategorizace úmrtí v souvislosti s intoxikací drogou nelze v roce 2002 hodnotit – úmrtím skončily pouze 3 z evidovaných 1000 případů

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 51

INTOXIKACE DROGAMI
ČR – 2002

Intoxikovaní podle hlásícího zařízení a krajů

	ARO	RZP	LSPP	JIP , Interna	Psychiatrie	Dětské	Soudní	Jiné	Centrální příjem	Celkem
Praha	2	4	*	188	*	9	*	1	63	**267**
Středočeský	19	3	*	6	*	14	*	2	*	**44**
Jihočeský	5	4	*	*	*	13	*	*	*	**22**
Plzeňský	56	*	*	6	*	*	*	11	*	**73**
Karlovarský	1	*	1	*	*	*	*	*	*	**2**
Ústecký	4	75	*	100	15	30	*	7	*	**231**
Liberecký	13	*	*	30	*	*	*	*	*	**43**
Královéhradecký	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Pardubický	*	*	*	20	*	*	*	*	*	**20**
Vysočina	2	14	*	2	*	*	*	*	*	**18**
Jihomoravský	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Olomoucký	5	5	*	2	*	*	*	*	*	**12**
Zlínský	1	3	*	5	*	3	*	*	*	**12**
Moravskoslezský	10	*	*	90	104	50	*	2	*	**256**
Celkem	**118**	**108**	**1**	**449**	**119**	**119**	*	**23**	**63**	**1000**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Tab. č. 52

INTOXIKACE DROGAMI
ČR – 2002

Základní droga podle pohlaví

Základní droga	Muži		Ženy		Celkem	Procento ze všech 1000 uživatelů
	Počet	%	Počet	%		
Heroin	117	*66,5*	59	*33,5*	**176**	***17,6***
Morfin	3	*75,0*	1	*25,0*	**4**	***0,4***
Kodein	2	*20,0*	8	*80,0*	**10**	***1***
Ostatní opiáty	4	*44,4*	5	*55,6*	**9**	***0,9***
Metadon	4	*100*	0	*0*	**4**	***0,4***
Metadon substitučně	0	*0*	2	*100*	**2**	***0,2***
Amfetamin	9	*75,0*	3	*25,0*	**12**	***1,2***
Pervitin	132	*69,1*	59	*30,9*	**191**	***19,1***
Extáze	1	*25,0*	3	*75,0*	**4**	***0,4***
Kokain	1	*50,0*	1	*50,0*	**2**	***0,2***
Marihuana	75	*76,5*	23	*23,5*	**98**	***9,8***
Hašiš	3	*100*	0	*0*	**3**	***0,3***
Barbituráty	9	*56,3*	7	*43,8*	**16**	***1,6***
Benzodiazepiny	43	*48,3*	46	*51,7*	**89**	***8,9***
Sedativa, hypnotika	52	*43,0*	69	*57,0*	**121**	***12,1***
LSD	2	*100*	0	*0*	**2**	***0,2***
Psilocybin	7	*100*	0	*0*	**7**	***0,7***
Toluen	34	*87,2*	5	*12,8*	**39**	***3,9***
Jiná rozpustidla	15	*78,9*	4	*21,1*	**19**	***1,9***
Jiné drogy a léky	67	*37,4*	112	*62,6*	**179**	***17,9***
Neznámá	9	*69,2*	4	*30,8*	**13**	***1,3***
Celkem	**589**	***58,9***	**411**	***41,1***	**1000**	***100***

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 53

INTOXIKACE DROGAMI
ČR – 2002

Drogy užité v kombinaci se základní drogou podle pohlaví

Základní droga	Muži		Ženy		Celkem	Procento ze všech 1000 uživatelů
	Počet	%	Počet	%		
Heroin	12	*54,5*	10	*45,5*	**22**	***2,2***
Morfin	0	*0*	1	*100*	**1**	***0,1***
Kodein	3	*50,0*	3	*50,0*	**6**	***0,6***
Ostatní opiáty	2	*50,0*	2	*50,0*	**4**	***0,4***
Amfetamin	3	*100*	0	*0*	**3**	***0,3***
Pervitin	41	*65,1*	22	*34,9*	**63**	***6,3***
Extáze	2	*100*	0	*0*	**2**	***0,2***
Speed	1	*100*	0	*0*	**1**	***0,1***
Kokain	2	*100*	0	*0*	**2**	***0,2***
Crack	1	*100*	0	*0*	**1**	***0,1***
Marihuana	25	*69,4*	11	*30,6*	**36**	***3,6***
Barbituráty	3	*75,0*	1	*25,0*	**4**	***0,4***
Benzodiazepiny	28	*56,0*	22	*44,0*	**50**	***5***
Sedativa, hypnotika	31	*52,5*	28	*47,5*	**59**	***5,9***
Toluen	1	*50,0*	1	*50,0*	**2**	***0,2***
Jiné drogy a léky	43	*47,8*	47	*52,2*	**90**	***9***
Alkohol v komb.s drogou	92	*52,3*	84	*47,7*	**176**	***17,6***
Neznámá	12	*54,5*	10	*45,5*	**22**	***2,2***

Pozn.: Z celkového počtu 1000 případů byla zaznamenána kombinace dvou drog u 402 osob (229 mužů, 173 žen), z nich 95 osob užilo třetí drogu (48 mužů, 47 žen) a z nich ještě 26 osob užilo čtvrtou drogu (14 mužů, 12 žen).

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 54

INTOXIKACE DROGAMI
ČR – 2002
Základní droga podle krajů

	Heroin a ost. opiáty	Pervitin a ost. stimul.	Kanabinoidy	Halucinogeny	Rozpustidla	Sedativa, hypnotika	Jiné drogy a léky	Neznámá	Celkem
Praha	86	82	40	1	20	33	1	4	**267**
Středočeský	5	8	9	2	3	13	4	*	**44**
Jihočeský	4	*	2	*	*	8	6	2	**22**
Plzeňský	8	5	*	*	2	41	17	*	**73**
Karlovarský	*	*	1	*	*	1	*	*	**2**
Ústecký	71	40	13	*	5	33	65	4	**231**
Liberecký	*	2	1	*	1	25	14	*	**43**
Královéhradecký	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Pardubický	*	*	2	*	*	13	5	*	**20**
Vysočina	*	1	1	1	4	10	*	1	**18**
Jihomoravský	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Olomoucký	1	4	1	*	1	4	1	*	**12**
Zlínský	*	2	6	*	1	1	2	*	**12**
Moravskoslezský	30	65	25	5	21	44	64	2	**256**
Česká republika	**205**	**209**	**101**	**9**	**58**	**226**	**179**	**13**	**1000**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 55

INTOXIKACE DROGAMI
ČR – 2002

Skupiny základní drogy podle věkových skupin a pohlaví

Skupiny základních drog	do 15			15 - 19			20 - 24			25 - 39			40 a více			Neznámá			Celkem		
	Muži	Ženy	Celk.	Muži	Ženy	Celk.	Muži	Ženy	Celk.	Muži	Ženy	Celk.	Muži	Ženy	Celk.	Muži	Ženy	Celk.	Muži	Ženy	Celk.
Heroin a ost. opiáty	0	2	**2**	16	11	**27**	48	30	**78**	58	24	**82**	8	8	**16**	*	*	*	**130**	**75**	**205**
Pervitin a ost. stimul.	2	0	**2**	15	17	**32**	55	23	**78**	59	21	**80**	12	5	**17**	*	*	*	**143**	**66**	**209**
Kanabinoidy	7	0	**7**	31	15	**46**	19	6	**25**	20	2	**22**	1	0	**1**	*	*	*	**78**	**23**	**101**
Halucinogeny	*	*	*	4	0	**4**	3	0	**3**	2	0	**2**	*	*	*	*	*	*	**9**	**0**	**9**
Rozpustidla	3	1	**4**	10	2	**12**	16	0	**16**	10	3	**13**	10	3	**13**	*	*	*	**49**	**9**	**58**
Sedativa, hypnotika	2	5	**7**	12	27	**39**	27	18	**45**	33	33	**66**	30	39	**69**	*	*	*	**104**	**122**	**226**
Jiné drogy a léky	2	5	**7**	16	35	**51**	9	9	**18**	21	29	**50**	19	34	**53**	*	*	*	**67**	**112**	**179**
Neznámá	*	*	*	1	3	**4**	4	1	**5**	3	0	**3**	1	0	**1**	*	*	*	**9**	**4**	**13**
Celkem	**16**	**13**	**29**	**105**	**110**	**215**	**181**	**87**	**268**	**206**	**112**	**318**	**81**	**89**	**170**	*	*	*	**589**	**411**	**1000**
tj. %	***2,7***	***3,2***	***2,9***	***17,8***	***26,8***	***21,5***	***30,7***	***21,2***	***26,8***	***35,0***	***27,3***	***31,8***	***13,8***	***21,7***	***17,0***	*	*	*	***100***	***100***	***100***

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 56

INTOXIKACE DROGAMI
ČR – 2002

Základní droga podle věkových skupin – srovnání počtu intoxikovaných v letech 2001 a 2002

Skupiny základních drog	do 15			15 - 19			20 - 24			25 - 39			40 a více			Neznámá			Celkem		
	2001	2002	Změna (%)	2001	2002	Změna (%)	2001	2002	Změna (%)	2001	2002	Změna (%)	2001	2002	Změna (%)	2001	2002	Změna (%)	2001	2002	Změna (%)
Heroin a ost. opiáty	1	**2**	+	52	**27**	*-48,1*	160	**78**	*-51,3*	80	**82**	*2,5*	10	**16**	*60,0*	*	*	*	**303**	**205**	*-32,3*
Pervitin a ost. stimul.	1	**2**	+	35	**32**	*-8,6*	61	**78**	*27,9*	82	**80**	*-2,4*	6	**17**	*183,3*	1	0	-	**186**	**209**	*12,4*
Kanabinoidy	4	**7**	+	36	**46**	*27,8*	15	**25**	*66,7*	8	**22**	*175,0*	0	**1**	+	*	*	*	**63**	**101**	*60,3*
Halucinogeny	4	*	-	15	**4**	*-73,3*	2	**3**	+	1	**2**	+	*	*	*	*	*	*	**22**	**9**	*-59,1*
Rozpustidla	5	**4**	-	26	**12**	*-53,8*	12	**16**	*33,3*	16	**13**	*-18,8*	16	**13**	*-18,8*	*	*	*	**75**	**58**	*-22,7*
Sedativa, hypnotika	9	**7**	-	51	**39**	*-23,5*	56	**45**	*-19,6*	111	**66**	*-40,5*	105	**69**	*-34,3*	*	*	*	**332**	**226**	*-31,9*
Jiné drogy a léky	12	**7**	*-41,7*	43	**51**	*18,6*	30	**18**	*-40,0*	50	**50**	*0*	47	**53**	*12,8*	*	*	*	**182**	**179**	*-1,6*
Neznámá	3	*	-	8	**4**	-	2	**5**	+	5	**3**	-	1	**1**	*0*	1	0	-	**20**	**13**	*-35,0*
Celkem	**39**	**29**	*-25,6*	**266**	**215**	*-19,2*	**338**	**268**	*-20,7*	**353**	**318**	*-9,9*	**185**	**170**	*-8,1*	**2**	**0**	-	**1183**	**1000**	*-15,5*
tj. % ze všech v daném roce	*3,3*	*2,9*	*	*22,5*	*21,5*	*	*28,6*	*26,8*	*	*29,8*	*31,8*	*	*15,6*	*17,0*	*	*0,2*	*0*	*	*100*	*100*	*

ozn.: Změny jsou vyčísleny pouze u skupin drog, kde bylo alespoň 10 osob v některém z hodnocených období.

) **Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003**

Tab. č. 57

INTOXIKACE DROGAMI
ČR – 2002

Základní droga podle frekvence užití

Základní droga	Opakovaný abusus		První kontakt		Neznámo		Celkem
	počet	%	počet	%	počet	%	
Heroin	**145**	***82,4***	2	*1,1*	29	*16,5*	**176**
Morfin	**1**	***25,0***	2	*50,0*	1	*25,0*	**4**
Kodein	**0**	***0***	5	*50,0*	5	*50,0*	**10**
Ostatní opiáty	**8**	***88,9***	0	*0*	1	*11,1*	**9**
Metadon	**3**	***75,0***	0	*0*	1	*25,0*	**4**
Metadon substitučně	**2**	***100***	0	*0*	0	*0*	**2**
Amfetamin	**8**	***66,7***	0	*0*	4	*33,3*	**12**
Pervitin	**154**	***80,6***	4	*2,1*	33	*17,3*	**191**
Extáze	**2**	***50,0***	0	*0*	2	*50,0*	**4**
Kokain	**1**	***50,0***	0	*0*	1	*50,0*	**2**
Marihuana	**35**	***35,7***	27	*27,6*	36	*36,7*	**98**
Hašiš	**2**	***66,7***	0	*0*	1	*33,3*	**3**
Barbituráty	**2**	***12,5***	7	*43,8*	7	*43,8*	**16**
Benzodiazepiny	**31**	***34,8***	34	*38,2*	24	*27,0*	**89**
Sedativa, hypnotika	**35**	***28,9***	47	*38,8*	39	*32,2*	**121**
LSD	**1**	***50,0***	1	*50,0*	0	*0*	**2**
Psilocybin	**2**	***28,6***	2	*28,6*	3	*42,9*	**7**
Toluen	**31**	***79,5***	3	*7,7*	5	*12,8*	**39**
Jiná rozpustidla	**12**	***63,2***	5	*26,3*	2	*10,5*	**19**
Jiné drogy a léky	**32**	***17,9***	85	*47,5*	62	*34,6*	**179**
Neznámá	**2**	***15,4***	1	*7,7*	10	*76,9*	**13**
Celkem	**509**	***50,9***	**225**	***22,5***	**266**	***26,6***	**1000**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 58

INTOXIKACE DROGAMI
ČR – 2002
Způsob aplikace základní drogy podle pohlaví

Základní droga	Injekční			Kouření			Požití			Inhalace			Jinak			Neznámo			Celkem		
	Muži	Ženy	Celk.	Muži	Ženy	Celk.	Muži	Ženy	Celk.	Muži	Ženy	Celk.	Muži	Ženy	Celk.	Muži	Ženy	Celk.	Muži	Ženy	Celk.
Heroin	110	55	**165**	1	0	**1**	2	2	**4**	*	*	*	1	1	**2**	3	1	**4**	**117**	**59**	**176**
Morfin	1	0	**1**	*	*	*	2	1	**3**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**3**	**1**	**4**
Kodein	*	*	*	*	*	*	2	8	**10**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**2**	**8**	**10**
Ostatní opiáty	4	1	**5**	*	*	*	0	4	**4**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**4**	**5**	**9**
Metadon	*	*	*	*	*	*	4	0	**4**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**4**	**0**	**4**
Metadon substitučně	*	*	*	*	*	*	0	2	**2**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**0**	**2**	**2**
Amfetamin	7	0	**7**	*	*	*	1	2	**3**	*	*	*	0	1	**1**	1	0	**1**	**9**	**3**	**12**
Pervitin	95	44	**139**	2	0	**2**	13	10	**23**	10	4	**14**	1	0	**1**	11	1	**12**	**132**	**59**	**191**
Extáze	*	*	*	0	0	**0**	1	3	**4**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**1**	**3**	**4**
Kokain	0	1	**1**	0	0	**0**	1	0	**1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**1**	**1**	**2**
Marihuana	1	0	**1**	64	19	**83**	10	4	**14**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**75**	**23**	**98**
Hašiš	*	*	*	1	0	**1**	1	0	**1**	1	0	**1**	*	*	*	*	*	*	**3**	**0**	**3**
Barbituráty	*	*	*	*	*	*	9	7	**16**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**9**	**7**	**16**
Benzodiazepiny	*	*	*	0	1	**1**	43	45	**88**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**43**	**46**	**89**
Sedativa, hypnotika	0	1	**1**	*	*	*	52	67	**119**	0	1	**1**	*	*	*	*	*	*	**52**	**69**	**121**
LSD	*	*	*	*	*	*	1	0	**1**	*	*	*	1	0	**1**	*	*	*	**2**	**0**	**2**
Psilocybin	*	*	*	*	*	*	7	0	**7**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**7**	**0**	**7**
Toluen	*	*	*	*	*	*	*	*	*	34	5	**39**	*	*	*	*	*	*	**34**	**5**	**39**
Jiná rozpustidla	*	*	*	*	*	*	11	2	**13**	4	2	**6**	*	*	*	*	*	*	**15**	**4**	**19**
Jiné drogy a léky	1	1	**2**	*	*	*	66	111	**177**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**67**	**112**	**179**
Neznámá	2	0	**2**	*	*	*	4	2	**6**	*	*	*	*	*	*	3	2	**5**	**9**	**4**	**13**
Celkem	**221**	**103**	**324**	**68**	**20**	**88**	**230**	**270**	**500**	**49**	**12**	**61**	**3**	**2**	**5**	**18**	**4**	**22**	**589**	**411**	**1000**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Tab. č. 59

INTOXIKACE DROGAMI
ČR – 2002

Základní droga podle příčiny

Základní droga	Předávkování		Jiná		Neznámá		Celkem
	počet	%	počet	%	počet	%	
Heroin	**134**	***76,1***	35	*19,9*	7	*4,0*	**176**
Morfin	**2**	***50,0***	0	*0*	2	*50,0*	**4**
Kodein	**9**	***90,0***	1	*10,0*	0	*0*	**10**
Ostatní opiáty	**7**	***77,8***	2	*22,2*	0	*0*	**9**
Metadon	**2**	***50,0***	1	*25,0*	1	*25,0*	**4**
Metadon substitučně	**1**	***50,0***	1	*50,0*	0	*0*	**2**
Amfetamin	**6**	***50,0***	4	*33,3*	2	*16,7*	**12**
Pervitin	**115**	***60,2***	43	*22,5*	33	*17,3*	**191**
Extáze	**4**	***100***	0	*0*	0	*0*	**4**
Kokain	**1**	***50,0***	1	*50,0*	0	*0*	**2**
Marihuana	**65**	***66,3***	25	*25,5*	8	*8,2*	**98**
Hašiš	**3**	***100***	0	*0*	0	*0*	**3**
Barbituráty	**15**	***93,8***	1	*6,3*	0	*0*	**16**
Benzodiazepiny	**83**	***93,3***	5	*5,6*	1	*1,1*	**89**
Sedativa, hypnotika	**101**	***83,5***	12	*9,9*	8	*6,6*	**121**
LSD	**0**	***0***	2	*100*	0	*0*	**2**
Psilocybin	**5**	***71,4***	2	*28,6*	0	*0*	**7**
Toluen	**25**	***64,1***	6	*15,4*	8	*20,5*	**39**
Jiná rozpustidla	**15**	***78,9***	2	*10,5*	2	*10,5*	**19**
Jiné drogy a léky	**156**	***87,2***	9	*5,0*	14	*7,8*	**179**
Neznámá	**8**	***61,5***	3	*23,1*	2	*15,4*	**13**
Celkem	**757**	***75,7***	**155**	***15,5***	**88**	***8,8***	**1000**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 60

INTOXIKACE DROGAMI
ČR – 2002

Základní droga podle typu bydliště

Základní droga	Stálé		Přechodné		Bezdomovec		Neznámo		Celkem
	počet	%	počet	%	**počet**	**%**	počet	%	
Heroin	163	*92,6*	5	*2,8*	**1**	***0,6***	7	*4,0*	**176**
Morfin	4	*100*	*	*	*	*	*	*	**4**
Kodein	10	*100*	*	*	*	*	*	*	**10**
Ostatní opiáty	8	*88,9*	*	*	*	*	1	*11,1*	**9**
Metadon	3	*75,0*	*	*	*	*	1	*25,0*	**4**
Metadon substitučně	2	*100*	*	*	*	*	*	*	**2**
Amfetamin	11	*91,7*	*	*	**1**	***8,3***	*	*	**12**
Pervitin	168	*88,0*	7	*3,7*	**7**	***3,7***	9	*4,7*	**191**
Extáze	4	*100*	*	*	*	*	*	*	**4**
Kokain	2	*100*	*	*	*	*	*	*	**2**
Marihuana	90	*91,8*	3	*3,1*	**1**	***1,0***	4	*4,1*	**98**
Hašiš	3	*100*	*	*	*	*	*	*	**3**
Barbituráty	14	*87,5*	1	*6,3*	*	*	1	*6,3*	**16**
Benzodiazepiny	85	*95,5*	*	*	**1**	***1,1***	3	*3,4*	**89**
Sedativa, hypnotika	110	*90,9*	5	*4,1*	*	*	6	*5,0*	**121**
LSD	2	*100*	*	*	*	*	*	*	**2**
Psilocybin	7	*100*	*	*	*	*	*	*	**7**
Toluen	31	*79,5*	2	*5,1*	**5**	***12,8***	1	*2,6*	**39**
Jiná rozpustidla	15	*78,9*	*	*	**3**	***15,8***	1	*5,3*	**19**
Jiné drogy a léky	168	*93,9*	4	*2,2*	**1**	***0,6***	6	*3,4*	**179**
Neznámá	12	*92,3*	*	*	*	*	1	*7,7*	**13**
Celkem	**912**	***91,2***	**27**	***2,7***	**20**	***2,0***	**41**	***4,1***	**1000**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 61

INTOXIKACE DROGAMI
ČR – 2002

Základní droga podle typu zaměstnání

Základní droga	Pravidelné		Nezaměst-naný, příležitostná práce		Jiné		Neznámé		Celkem
	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%	
Heroin	6	*3,4*	**37**	***21,0***	4	***2,3***	129	*73,3*	**176**
Morfin	1	*25,0*	**1**	***25,0***	1	***25,0***	1	*25,0*	**4**
Kodein	5	*50,0*	**2**	***20,0***	2	***20,0***	1	*10,0*	**10**
Ostatní opiáty	1	*11,1*	**2**	***22,2***	3	***33,3***	3	*33,3*	**9**
Metadon	*	*	**2**	***50,0***	*	*	2	*50,0*	**4**
Metadon substitučně	*	*	*	*	*	*	2	*100*	**2**
Amfetamin	1	*8,3*	**8**	***66,7***	1	***8,3***	2	*16,7*	**12**
Pervitin	10	*5,2*	**66**	***34,6***	10	***5,2***	105	*55,0*	**191**
Extáze	1	*25,0*	**1**	***25,0***	*	*	2	*50,0*	**4**
Kokain	*	*	*	*	*	*	2	*100*	**2**
Marihuana	35	*35,7*	**11**	***11,2***	17	***17,3***	35	*35,7*	**98**
Hašiš	2	*66,7*	*	*	1	***33,3***	*	*	**3**
Barbituráty	5	*31,3*	*	*	2	***12,5***	9	*56,3*	**16**
Benzodiazepiny	34	*38,2*	**14**	***15,7***	16	***18,0***	25	*28,1*	**89**
Sedativa, hypnotika	48	*39,7*	**20**	***16,5***	21	***17,4***	32	*26,4*	**121**
LSD	*	*	*	*	*	*	2	*100*	**2**
Psilocybin	3	*42,9*	**2**	***28,6***	2	***28,6***	*	*	**7**
Toluen	8	*20,5*	**20**	***51,3***	2	***5,1***	9	*23,1*	**39**
Jiná rozpustidla	5	*26,3*	**5**	***26,3***	*	*	9	*47,4*	**19**
Jiné drogy a léky	56	*31,3*	**38**	***21,2***	43	***24,0***	42	*23,5*	**179**
Neznámá	1	*7,7*	**1**	***7,7***	*	*	11	*84,6*	**13**
Celkem	**222**	***22,2***	**230**	***23,0***	**125**	***12,5***	**423**	***42,3***	**1000**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Intoxikace drogami
ČR - 2002
Podíl skupin základní drogy

Graf č. 22



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Intoxikace drogami
ČR - 2002

Graf č. 23

Intoxikované osoby podle věkových skupin



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

PLNĚNÍ METADONOVÉHO PROGRAMU V ROCE 2002

Rok 2002 lze v oblasti substituční léčby metadonem charakterizovat stagnaci počtu pacientů metadonových center, způsobených několika faktory:

- naplněním kapacity substitučních center v regionech s vysokou koncentrací problémových uživatelů opiátů (Praha, Ústí nad Labem, Brno), kde musely být vytvořeny seznamy čekatelů na léčbu
- špatnou dostupností center pro pacienty ze vzdálenějších lokalit v regionech, kde je koncentrace problémových uživatelů opiátů podstatně nižší než ve výše jmenovaných (Olomouc, Hradec Králové)
- neoslovením populace z vysoce rizikových skupin / sociálně marginalizovaných skupin v regionech, kde se problémové užívání opiátů právě do těchto (minoritiních) skupin koncentruje (Severní Morava)
- neexistencí substitučních center v regionech s potenciální poptávkou po této léčebné modalitě (Budějovický, Plzeňský kraj)
- nedostupností metadonového hromadně vyráběného léčebného přípravku, který by mohl být předepisován mimo specializovaná centra

Kvalitativní informace nasvědčují závěru, že v roce 2002 získal v substituční léčbě nezanedbatelné místo preparát Subutex, obsahující buprenorfin. Ten v roce 2002 nepodléhal hlásné povinnosti, a tudíž neexistují kvalitativní data o jeho preskripci (především v ordinacích ambulantních psychiatrů a praktických lékařů).

Interdisciplinární pracovní skupina „Substituce“ projektu Phare Twinning „Posílení protidrogové politiky,“ která v roce 2002 pracovala při Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky, v reakci na popsaný stav dospěla v rámci analýzy potřeb k následujícím závěrům, jimž podřídila svou další činnost:

1) **Rozšířit dostupnost substituční léčby rovnoměrně na celé území republiky**, tj. umožnit podávání a preskripci metadonu a buprenorfinu (příp. dalších substitučních látek) pacientům nejen ve specializovaných zařízeních, ale také psychiatrům, všeobecným a

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

dorostovým lékařům, a to za přesně definovaných podmínek. Za nejvýhodnější považuje expertní skupina model, používaný u jiných specializovaných terapií – tj. diagnózu a úvod do terapie specializovaným zařízením, možnost převodu stabilizovaného pacienta do dispenzární péče místně dostupného lékaře a ustavení toku informací a pacientů mezi dispenzární ordinací a specializovaným zařízením podle pacientových potřeb ve smyslu aktuálních poznatků lékařské vědy.

2) Provádění substituční léčby **nesmí** pro poskytovatele **představovat ekonomickou ztrátu**; to musí být zohledněno v politice pojišťoven ve smyslu hrazení alespoň jednoho substitučního přípravku a hrazení příslušných zdravotních úkonů.

3) Léčba (nejen opiátové) závislosti musí být **dostupná v policejním zadržení i vazbě**, a to jak léčba opiátovými agonisty, tak bez jejich použití. Přerušení léčby může znamenat významnou hrozbu pro pacientovo zdraví.

4) Zvýšení dostupnosti substituční léčby musí předcházet relevantní vzdělávací **program pro jeho poskytovatele**.

5) Skupina klade důraz na **evaluaci substitučních léčeb** ve smyslu akreditačních standardů.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 62

Registr metadonové léčby - stav k 1. lednu 2003

Centra	Stav registru k 31.12.2002	Registr 2002		Registr celkem 2000 - 2002		Z toho ukončilo léčbu v roce 2000 - 2002						
		Přijetí	Ukončení	Přijetí	Ukončení	Převedení do jiného zařízení	Převedení na jiný typ léčby	Ukončení léčby pro porušení	Ukončení léčby pro nástup trestu	Úmrtí pacienta	Jiný důvod	Celkem
VFN Praha 2	**54**	21	28	**162**	**107**	31	15	46	*	1	14	**107**
FNsP Ostrava-Poruba	**2**	7	5	**9**	**5**	2	*	2	*	*	1	**5**
Ambulance AT Olomouc	**4**	3	0	**8**	**3**	1	*	*	*	*	2	**3**
DPS ELYSIUM Brno	**52**	0	1	**59**	**7**	1	*	2	3	*	1	**7**
Metadonová jednotka Ústí n.ad Labem	**119**	102	106	**360**	**243**	6	12	185	21	*	19	**243**
DROP IN o.p.s. Praha 1	**100**	205	218	**562**	**458**	31	21	339	4	1	62	**458**
Ambulance OAT Hradec Králové	**11**	6	3	**17**	**4**	2	*	1	*	*	1	**4**
Ordinace AT Mělník	**11**	14	12	**34**	**25**	5	2	6	*	*	12	**25**
Celkem	**353**	**358**	**373**	**1211**	**852**	**79**	**50**	**581**	**28**	**2**	**112**	**852**

Zdroj: ÚZIS

TRENDY INCIDENCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG ZA OBDOBÍ 1995 – 2002

V této části výroční zprávy jsou prezentovány trendy incidence léčených uživatelů drog a trendy zdravotních dopadů, které s sebou užívání drog přináší. K dispozici jsou již údaje za 8 let sledování nově registrovaných uživatelů drog v jednotlivých letech, tj. za období 1995 – 2002.

Prezentovaná data sice představují informace pouze o léčených uživatelích drog a neberou tedy v úvahu tzv. skrytou či experimentující populaci, ale to nijak nesnižuje validitu a význam jejich trendů.

Zatímco stoupající charakter některých trendů (např. incidence léčených uživatelů drog) může být částečně ovlivněn i postupně se zvyšujícím počtem hlásících L/K center a hlásnou morálkou jejich pracovníků, u jiných trendů však ani tato eventualita nijak neovlivňuje jejich směřování a tyto trendy objektivně informují o vývoji naší drogové scény (např. druhy užívaných drog a způsob jejich aplikace).

Sledování trendů užívaných drog a charakteristik jejich uživatelů na celostátní úrovni eliminuje náhodné místní i časové výkyvy a může sloužit jako základní orientační východisko při tvorbě účinné protidrogové politiky a hodnocení jejich efektivity.

Souhrnné *tabulky č. 63* a *64* podávají informace o vývoji incidence uživatelů drog, evidovaných v L/K centrech od zahájení DIS v roce 1995. Zároveň jsou v nich zaznamenány i trendy některých deskriptivních zdravotních ukazatelů, jakými jsou např. věk, pohlaví, injekční užívání a druh užívané drogy.

Graf č. 24 zachycuje vývoj věkově specifické incidence léčených uživatelů drog ve věkové skupině 15 – 39 let. Již bylo zmíněno, že nesporně vzestupný trend incidence mohl být v prvních letech sledování nepochybně ovlivněn zvyšujícím se počtem L/K center a zlepšující se hlásící morálkou jejich pracovníků. V posledních letech však již vypovídá o nepříznivě se vyvíjející drogové scéně ve všech krajích ČR. V roce 2002 byla ve věkové skupině 15 – 39letých zaznamenána nejvyšší hodnota incidence – 118,1 / 100 000 obyvatel této věkové skupiny – od zahájení DIS.

Graf č. 25 znázorňuje trendy incidence uživatelů opiátů a stimulancií, tedy problémových uživatelů drog ve smyslu doporučení EMCDDA. Obecně lze konstatovat, že

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

incidence uživatelů stimulancií (převážně pervitinu) má – kromě nepatrného poklesu v letech 1999 a 2000 – výrazně vzestupný charakter a od zahájení DIS se více než zdvojnásobila. Incidence uživatelů opiátů (téměř výlučně heroinu) má podobně vzestupný charakter – s nepatrným poklesem v letech 1997 a 1998. Také u opiátů lze hovořit o dvojnásobném vzestupu od zahájení DIS, i když na zhruba polovičních hodnotách incidence, než je tomu u stimulancií.

Detailnější pohled na obě křivky jasně ukazuje na zrcadlový obraz užívání těchto dvou skupin drog. Snížené počty uživatelů stimulancií jsou provázeny zvýšenými počty uživatelů opiátů a naopak. Zvlášť výrazně se to projevilo v uplynulém roce, kdy incidence uživatelů stimulancií byla více než třikrát vyšší než incidence uživatelů opiátů. Nepochybně by bylo zajímavé zjistit, do jaké míry koresponduje průběh obou křivek s policejními event. celními informacemi o změnách v dostupnosti a cenách těchto drog.

Graf č. 26 ukazuje trendy incidence registrovaných uživatelů heroinu a pervitinu jako základní drogy a jejich kumulaci za osmileté období. Z grafu je patrný významný nárůst uživatelů pervitinu v roce 2002, provázený poklesem uživatelů heroinu. Za osmileté období bylo již registrováno téměř 14 500 uživatelů pervitinu a asi 6 300 uživatelů heroinu jako základní drogy.

Graf č. 27 porovnává trendy průměrného věku léčených uživatelů heroinu, pervitinu, marihuany a rozpustidel v době jejich prvé návštěvy v L/K centrech. Z grafu je vidět, že zatímco relativně nízký průměrný věk u uživatelů marihuany a rozpustidel (tj. 18 – 19 let) se lety prakticky nemění, průměrný věk uživatelů heroinu a pervitinu se pozvolna zvyšuje. Nejvyšší průměrný věk v době prvé návštěvy v L/K centru mají uživatelé heroinu (v roce 2002 to již bylo 23,4 roku), průměrný věk uživatelů pervitinu byl v loňském roce 22,3 roku.

Grafy č. 28 a 29 zachycují trendy proporcionálního zastoupení pohlaví u uživatelů heroinu a pervitinu v jednotlivých letech. Zatímco u uživatelů pervitinu je možno v posledních letech pozorovat mírný nárůst zastoupení mužů, kteří nyní tvoří asi 2/3 uživatelů pervitinu, pak převaha mužů – uživatelů heroinu je větší a dosahuje až 70 %.

Z hlediska možných zdravotních důsledků užívání drog je závažný následující *graf č. 30*, znázorňující počty nově registrovaných injekčních uživatelů drog a jejich kumulaci za období 1995 – 2002. Počty injekčních uživatelů drog každoročně narůstají a koncem roku 2002 jich bylo evidováno již téměř 18 000. Mezi injekčními uživateli drog vysoko převažují uživatelé pervitinu, v průběhu roku 2002 došlo dokonce k jejich dalšímu nárůstu. Naopak počty injekčních uživatelů heroinu v uplynulém roce výrazně poklesly (*graf č. 31*).

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Informace o tom, zda injekční uživatelé drog, identifikovaní v dřívějších letech, v této aplikaci i nadále pokračují, nejsou k dispozici a mohl by je upřesnit pouze celostátní registr problémových uživatelů drog, který by ve změnových hlášeních průběžně zaznamenával nejen změny ve způsobu aplikace drogy, ale přinášel by i informace o vyléčení klienta či o jeho event. úmrtí.

Na *grafech č. 32* a 33 jsou zachyceny změny ve způsobech aplikace heroinu a pervitinu, ke kterým došlo ve sledovaném období. V průběhu roku 2002 více než 82 % uživatelů pervitinu aplikovalo pervitin injekčně. Mírný vzestup procentuálního zastoupení injekčních uživatelů pervitinu v posledních 2 letech připadá na ženy. Injekční aplikace u uživatelů heroinu se pohybuje dokonce kolem 90 % a procentuální zastoupení mužů a žen se v posledních letech prakticky nemění.

Kromě informací o průměrném věku u problémových uživatelů drog jsou získávány i údaje o věku prvního užití základní drogy, které umožňují sledovat délku doby užívání drogy před první návštěvou L/K centra, tedy doby, která uplyne, než užívání drogy vyústí v nějaké zdravotní či socioekonomické problémy. *Graf č. 34* dokumentuje vývoj změn za osmileté období u uživatelů pervitinu, *graf č. 35* pak stejnou situaci u uživatelů heroinu. U uživatelů obou nejzávažnějších drog dochází v průběhu sledovaných let ke zřetelnému prodlužování intervalu mezi prvním užitím těchto drog a první návštěvou v L/K centru. Uživatelé pervitinu se objevují se svými problémy v L/K centrech dříve než uživatelé heroinu. V průběhu roku požádalo o pomoc v L/K centrech do let od začátku užívání zhruba % uživatelek pervitinu a 30 % mužů udávajících pervitin jako základní drogu. Uživatelky heroinu navštívily v průběhu roku 2002 poprvé L/K centra do 2 let od začátku užívání drogy asi ve 30 %, zatímco muži asi ve 22 %. Vysvětlení pro prodlužování intervalu mezi prvním užitím drogy a žádostí o prvé léčení může být pouze spekulativní, v úvahu přichází stoupající činnost výměnných programů stříkaček a jehel, obavy z represe, možnosti řešení problémů svépomocí apod.

Na následujícím *grafu č. 36* jsou porovnávány trendy vybraných drog, udávaných uživateli drog v jednotlivých letech jako droga základní či jako droga sekundární (rozdílné jsou stupnice v horní a dolní části grafu).

Nejčastěji užívaná droga – pervitin – vykazuje trvalý nárůst, s poměrně četným zastoupením i jako droga sekundární, což je především u uživatelů heroinu jako základní drogy. U druhé nejčastěji udávané drogy – marihuany – se jedná opět o trvale vzestupný trend, ale v převážné většině jde o drogu sekundární. U heroinu dochází v průběhu roku 2002,

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

po předchozích letech mírného vzestupu, k poklesu. Počty osob, udávajících heroin jako drogu sekundární, jsou stabilní a tvoří je především uživatelé pervitinu jako základní drogy.

Z ostatních drog stojí za pozornost rychlý nárůst uživatelů extáze v posledních 2 - 3 letech, sice většinou opět jako sekundární drogy, ale evidovány jsou již i desítky klientů, udávajících extázi jako základní a jedinou užívanou drogu.

Soubor *grafů č. 37* porovnává vývoj drogové situace v jednotlivých krajích. Sledovány byly následující ukazatele:

- incidence léčených uživatelů drog ve věkové skupině 15 – 39 let
- injekční uživatelé drog
- incidence problémových uživatelů opiátů a
- incidence problémových uživatelů stimulancií

(všechny v přepočtu na 10 000 obyvatel příslušného kraje).

Vzhledem k tomu, že grafy pro všechny kraje i pro ČR jsou ve stejném měřítku, dokumentují rozdílnost situace a trendů v jednotlivých krajích v letech 1995 – 2002. Vývoj situace si čtenář jistě posoudí sám.

Zdravotní důsledky injekčního užívání drog dokumentuje tabulky a grafy týkající se virových hepatitid A, B a C. Tabulka č. 65 a *grafy č. 38, 39* a *40* podávají přehled, ve kterých věkových skupinách byly mezi nemocnými virovou hepatitidou A, B a C zjištěny osoby s rizikovým chováním a jejich podíl v příslušné věkové skupině nemocných. Zatímco virová hepatitida A má jak celkově, tak ve většině věkových skupin sestupný trend, u virové hepatitidy B a C je patrný vysoký podíl osob s rizikovým chováním ve věkových skupinách, které korespondují s nejvíce postiženými věkovými skupinami co se týká injekčního užívání drog mezi evidovanými problémovými uživateli drog.

Z tabulky č. 66 je patrný trend počtu a podílu injekčních uživatelů drog mezi nemocnými virovou hepatitidou A, B a C v letech 1997 – 2002, tuto situaci znázorňuje i *graf č. 41*. Podíl injekčních uživatelů drog mezi nemocnými virovou hepatitidou A se od roku 1997 snižoval, v roce 2002 však opět zaznamenal vzestup na 4,7 %. Podíl injekčních uživatelů drog mezi nemocnými virovou hepatitidou B je po vzestupu mezi roky 1997 – 2000 bez výrazných změn. Podíly injekčních uživatelů drog mezi nemocnými virovou hepatitidou C je podstatně vyšší, než u virových hepatitid A a B, zaznamenala stejně jako virová

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

hepatitida B vzestup v letech 1997 – 2000, po mírném poklesu se v letech 2001 a 2002 drží na zhruba 60 % z nemocných virovou hepatitidou C.

Druhým dlouhodobě sledovaným ukazatelem zdravotních důsledků užívání drog je sentinelovým způsobem prováděná evidence intoxikací v souvislosti s užitím drogy. *Graf č. 42* zachycuje trend podílu skupin drog, které se na těchto případech podílely jako základní užitá droga. V letech 1995 – 2002 je patrný soustavný pokles skupiny hypnotik a sedativ (včetně benzodiazepinů a barbiturátů), který v prvních třech letech měl souvislost se zkvalitněním výběru evidovaných případů (nebyly dostatečně důsledně vyřazeny všechny náhodné intoxikace či suicidální pokusy těmito látkami), od roku 1998 však již byla metodika evidence jednotlivých případů zpřesněna a sjednocena. Závažný je sice kolísající, ale soustavně se zvyšující podíl intoxikací pervitinem a dalšími stimulancii, podíl intoxikací heroinem se od roku 1999 sice snižuje, ale teprve v roce 2002 se dostal až za podíl intoxikací stimulancii. Zajímavým zjištěním je zvýšení podílu intoxikací kanabinoidy v roce 2002. Rozpustidla, která tvořila zhruba 15 % případů v roce 1995 představují v posledních letech při podobném počtu případů jen asi 6 %.

Graf č. 43 demonstruje změny podílu věkových skupin osob intoxikovaných v souvislosti s užitím drogy. Od roku 1999 lze pozorovat snižování podílu i počtu těchto osob v obou nejmladších věkových skupinách, podíl 20 – 24letých se podstatněji nemění, ale zvyšuje se podíl intoxikovaných osob ve věkové skupině 25 – 39 let, což koresponduje i s prevalenčními údaji evidovaných problémových uživatelů drog.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 63

TRENDY NOVĚ EVIDOVAVÝCH UŽIVATELŮ DROG – ŽADATELŮ O LÉČBU ČR , 1995 - 2002

Základní data 1995 – 2002 (*1. část)*

	rok 1995	rok 1996	rok 1997	rok 1998	rok 1999	rok 2000	rok 2001	rok 2002
Incidence na 100 000 obyvatel	23,9	31,5	30,4	37,4	37,7	40,3	41,2	45,9
Specifická incidence u 15-39letých/ 100 000 obyvatel	62,9	78,7	75,1	96,3	99,0	105,5	106,1	118,1
Poměr mužů a žen	2,4 : 1	1,9 : 1	1,7 : 1	2,0 : 1	1,9 : 1	1,9 : 1	1,9 : 1	2,1 : 1
Procento uživatelů mladších 19ti let	47,2	57,4	54,1	52,4	49,1	47,5	43,9	42,4
Procento injekčních uživatelů	54,3	56,5	55,0	61,8	64,0	62,3	64,8	58,5
Procento injekčních uživatelů mladších 19ti let - z uživatelů mladších 19ti let - ze všech injekčních uživatelů - ze všech evidovaných uživatelů	 51,6 44,9 24,4	 53,9 54,7 30,9	 52,1 51,2 28,2	 54,9 46,5 28,8	 52,5 40,3 25,8	 50,9 38,8 24,2	 52,4 35,5 23,0	 45,7 33,1 19,4
Počty nově evidovaných uživatelů heroinu (základní i sekundární droga)	529 tj. 21,4 %	1050 tj. 32,3 %	945 tj. 30,2 %	909 tj. 23,6 %	1094 tj. 28,1 %	1229 tj. 29,6 %	1362 tj. 32,2 %	947 tj. 20,1 %
Počty nově evidovaných uživatelů pervitinu (základní i sekundární droga)	1252 tj. 50,7 %	1757 tj. 54,0 %	1946 tj. 62,1 %	2642 tj. 68,5 %	2554 tj. 65,6 %	2576 tj. 62,1 %	2545 tj. 60,1 %	2932 tj. 62,1 %

) Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Tab. č. 64

TRENDY NOVĚ EVIDOVAVÝCH UŽIVATELŮ DROG – ŽADATELŮ O LÉČBU ČR , 1995 - 2002

Základní data 1995 – 2002 dle EMCDDA *(2. část)*

	rok 1995	rok 1996	rok 1997	rok 1998	rok 1999	rok 2000	rok 2001	rok 2002
Počet nových klientů žádajících o léčbu	**2470**	**3252**	**3132**	**3858**	**3891**	**4148**	**4233**	**4719**
Podíl mužů (%) a žen (%)	**73,1 : 26,9**	**65,2 : 34,8**	**62,9 : 36,8**	**66,1 : 33,9**	**65,5 : 34,4**	**65,3 : 34,5**	**65,1 : 34,7**	**67,2 : 32,3**
Průměrný věk (v rocích)	**22,8**	**21,5**	**20,8**	**20,6**	**20,8**	**20,9**	**21,3**	**21,8**
Věková distribuce (%) do 15 let	42	160	73	112	92	83	97	108
15 – 19 let	1124	1707	1621	1911	1819	1887	1763	1892
20 – 24 let	648	721	834	1212	1308	1447	1498	1597
25 – 29 let	239	303	234	307	407	426	492	645
30 – 34 let	140	112	113	141	140	136	178	243
35 – 39 let	71	41	34	57	46	68	65	101
40 – 44 let	68	44	28	22	16	23	23	49
45 – 49 let	33	32	23	8	15	14	15	16
50 – 54 let	24	21	17	16	7	5	6	11
55 – 59 let	46	26	17	12	17	8	11	10
60 – 64 let								5
65 let a starší								0
Počet klientů, s chybějícím údajem o věku	*35*	*85*	*138*	*60*	*24*	*51*	*85*	*60*
Užívá drogu injekčně v současnosti (%)	*	*	*	*	*	**53,3**	**64,8**	**58,5**
Užíval injekčně drogu v minulosti, ne v současnosti (%)	*	*	*	*	*	**11,3**	**2,3**	**13,4**
Užil injekčně nějakou drogu kdykoliv v životě (%)	*	*	**59,2**	**64,6**	**66,3**	**64,6**	**67,1**	**71,9**
Podíl injekčních uživatelů základní drogy (%)	**50,8**	**52,7**	**50,8**	**58,7**	**63,9**	**58,8**	**62,9**	**55,3**

) **Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003**

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

VIROVÁ HEPATITIDA TYPU A, B a C
ČR – 2002
Podíl osob s rizikovým chováním podle věkových skupin (v % ve věkové skupině)
- srovnání let 1997 - 2002

Věková skupina	Virová hepatitida A						Virová hepatitida B						Virová hepatitida C					
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	1997	1998	1999	2000	2001	2002	1997	1998	1999	2000	2001	2002
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 – 4	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 – 9	0,8	0	0	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 – 14	3,4	1,8	2,3	4,8	0	0	16,6	0	25,0	8,3	0	0	0	100	100	33,3	66,7	0
15 – 19	**45,0**	**46,4**	**50,0**	**19,0**	**35,5**	**22,2**	**29,7**	**59,2**	**58,0**	**64,6**	**62,1**	**54,4**	**88,1**	**87,1**	**81,0**	**88,3**	**85,2**	**80,0**
20 – 24	**31,5**	**42,7**	**36,7**	**9,1**	**19,0**	**17,6**	**20,0**	**48,8**	**53,8**	**58,3**	**59,5**	**49,5**	**77,4**	**76,5**	**81,1**	**82,1**	**66,2**	**75,9**
25 – 34	15,9	21,8	17,3	3,3	3,8	0	17,9	25,7	35,6	43,3	37,8	22,4	63,9	60,3	64,7	77,8	76,6	54,2
35 – 44	4,9	8,5	3,3	10,3	4,2	8,3	7,8	10,9	20,0	13,8	18,6	24,0	10,0	42,9	50,0	54,5	45,5	31,6
45 – 54	5,4	1,7	2,0	0	0	0	0	2,4	10,2	3,7	4,7	5,0	10,0	0	0	36,4	13,3	20,0
55 – 64	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8	2,1	0	0	0	10,0	0	0	0	0
64 – 74	0	0	0	16,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 +	0	0	0	0	0	0	0	3,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	**19,3**	**23,6**	**16,6**	**4,7**	**6,8**	**4,7**	**10,8**	**22,8**	**29,1**	**33,9**	**33,1**	**27,1**	**57,7**	**65,5**	**67,2**	**73,4**	**66,3**	**59,6**

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

VIROVÁ HEPATITIDA TYPU A, B a C
ČR – 2002

Výskyt virové hepatitidy typu A, B a C a podíl injekčních narkomanů - srovnání let 1997 – 2002

	Virová hepatitida A						Virová hepatitida B						Virová hepatitida C					
	1997	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**
Celkem případů	1187	904	933	614	325	127	557	575	636	604	457	413	220	319	329	319	276	213
Z toho injekčních narkomanů	212	184	143	18	5	6	46	107	150	164	129	112	116	195	211	218	167	127
% injekčních narkomanů	17,9	20,4	15,3	2,9	1,5	4,7	8,3	18,6	23,6	27,2	28,2	27,1	52,7	61,1	64,1	68,3	60,5	59,6

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Graf č. 24

Trendy prvně léčených uživatelů drog
ČR, 1995 - 2002
Nově zachycení uživatelé drog ve věku 15 - 39 let
a jejich specifická věková incidence



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
počet osob	2222	2892	2836	3628	3720	3964	3996	4460
počet osob/100 000 obyvatel	59	76,8	75,3	96,3	98,8	105,3	106,1	118,1

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Graf č. 25

Trendy prvně léčených uživatelů drog
ČR, 1995 - 2002
Problémoví uživatelé opiátů a stimulancií a jejich incidence



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
uživatelé opiátů	457	882	692	657	869	1044	1213	788
uživatelé stimulancií	1038	1421	1540	2199	2064	1917	2029	2598
incidence uživatelů opiátů	4,4	8,6	6,7	6,4	8,5	10,2	11,8	7,7
incidence uživatelů stimulancií	10,1	13,8	15,0	21,4	20,1	18,6	19,7	25,3

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Graf č. 26

Trendy prvně léčených uživatelů drog
ČR, 1995 - 2002
Počet nově registrovaných uživatelů heroinu a pervitinu a jejich kumulace



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
počet uživatelů heroinu	378	813	690	657	869	1023	1184	675
počet uživatelů pervitinu	1005	1390	1531	2199	2064	1880	1969	2389
kumulace počtu uživatelů heroinu	378	1191	1881	2538	3407	4430	5614	6289
kumulace počtu uživatelů pervitinu	1005	2395	3926	6125	8189	10069	12038	14427

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Graf č. 27

Trendy prvně léčených uživatelů drog
ČR, 1995 - 2002
Průměrný věk nově registrovaných uživatelů vybraných drog



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Heroin	21,9	18,4	21,0	21,9	21,5	21,5	22,1	23,4
Pervitin	21,3	20,9	20,2	20,4	21,0	21,4	21,6	22,3
Marihuana	19,3	18,7	18,6	18,4	18,6	18,5	18,3	18,7
Toluen a jiná rozp.	19,3	18,1	19,0	18,1	17,5	18,6	18,3	18,4

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Graf č. 28

Trendy prvně léčených uživatelů drog
ČR, 1995 - 2002
Trend podílu mužů a žen u uživatelů pervitinu



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
neznámé pohlaví	0	1	4	1	5	4	3	7
ženy	379	555	611	860	797	720	747	867
muži	625	834	895	1316	1240	1156	1219	1515

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Trendy prvně léčených uživatelů drog
ČR, 1995 - 2002
Trend podílu mužů a žen u uživatelů heroinu

Graf č. 29



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
neznámé pohlaví	0	0	2	0	0	3	3	2
ženy	135	246	225	155	241	319	374	203
muži	243	567	445	461	595	701	807	470

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Graf č. 30

Trendy prvně léčených uživatelů drog
ČR, 1995 - 2002
Počet nově registrovaných injekčních uživatelů drog a jejich kumulace



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
počet injekčních uživatelů	1335	1838	1722	2386	2488	2586	2745	2760
kumulace počtu injekčních uživatelů	1335	3173	4895	7281	9769	12355	15100	17860

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Graf č. 31

Trendy prvně léčených uživatelů drog
ČR, 1995 - 2002
Počet nově registrovaných injekčních uživatelů heroinu a pervitinu a jejich kumulace



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
počet injekčních uživatelů heroinu	285	549	503	486	731	911	1028	591
počet injekčních uživatelů pervitinu	877	1095	1048	1698	1615	1502	1572	1950
kumulace počtu injekčních uživatelů heroinu	285	834	1337	1823	2554	3465	4493	5084
kumulace počtu injekčních uživatelů pervitinu	877	1972	3020	4718	6333	7835	9407	11357

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Trendy prvně léčených uživatelů drog
ČR, 1995 - 2002
Trend podílu způsobu aplikace mezi uživateli heroinu

Graf č.32



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
ostatní aplikace	93	264	169	130	105	112	156	84
injekčně - ženy	98	156	118	159	207	287	328	176
injekčně - muži	187	393	368	343	524	622	698	413

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Graf č 33

Trendy prvně léčených uživatelů drog
ČR, 1995 - 2002
Trend podílu způsobu aplikace mezi uživateli pervitinu



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
ostatní aplikace	127	295	462	479	427	378	394	439
injekčně - ženy	326	421	425	662	631	566	587	867
injekčně - muži	551	672	619	1035	997	933	986	1239

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Trendy prvně léčených uživatelů drog
ČR, 1995 - 2002

Doba užívání pervitinu u mužů před návštěvou léčebně/kontaktního centra



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
6 a víc let	66	99	43	113	102	144	154	287
5 let	28	41	27	44	82	71	78	112
4 roky	24	47	41	79	79	90	94	114
3 roky	63	98	83	166	168	147	132	180
2 roky	111	144	176	254	247	227	196	236
1 rok	199	253	316	427	373	269	330	322
do 6 měsíců	134	150	49	62	41	29	21	65

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Doba užívání pervitinu u žen před návštěvou léčebně/kontaktního centra



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
6 a víc let	18	35	19	33	33	34	49	80
5 let	5	15	6	19	33	21	30	36
4 roky	15	20	20	33	42	46	46	43
3 roky	39	44	44	74	81	82	66	99
2 roky	50	115	94	173	152	159	140	155
1 rok	128	192	271	345	284	257	271	253
do 6 měsíců	124	127	32	52	47	31	14	47

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Graf č. 35

Trendy prvně léčených uživatelů drog
ČR, 1995 - 2002

Doba užívání heroinu u mužů před návštěvou léčebně/kontaktního centra



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
6 a víc let	13	42	21	24	49	64	93	75
5 let	7	5	12	28	38	60	64	33
4 roky	5	26	23	55	63	72	84	50
3 roky	20	40	56	79	96	94	120	70
2 roky	43	126	126	98	114	158	141	82
1 rok	100	215	151	132	178	181	163	67
do 6 měsíců	55	104	20	19	13	18	16	30

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Doba užívání heroinu u žen před návštěvou léčebně/kontaktního centra



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
6 a víc let	1	8	5	6	6	19	29	30
5 let	0	1	3	8	15	18	22	22
4 roky	6	2	12	8	22	25	29	23
3 roky	6	16	29	25	19	41	46	22
2 roky	28	41	50	41	49	68	72	32
1 rok	57	104	76	42	83	121	113	41
do 6 měsíců	37	68	12	9	23	13	9	12

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Graf č. 36

Trendy prvně léčených uživatelů drog
ČR, 1995 - 2002

Trend podílu užívání vybraných drog jako základní a sekundární droga

Heroin



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
sekundární droga	151	237	273	293	258	206	178	272
základní droga	378	813	672	616	836	1023	1184	675

Pervitin



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
sekundární droga	248	367	436	465	512	696	576	543
základní droga	1004	1390	1510	2177	2042	1880	1969	2389

Marihuana



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
sekundární droga	469	716	814	1146	1193	1228	1213	1249
základní droga	280	369	495	618	641	904	742	1068

LSD



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
sekundární droga	175	256	271	290	319	282	200	178
základní droga	42	39	25	29	31	30	17	13

Extáze



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
sekundární droga	5	20	36	31	69	127	243	403
základní droga	3	6	12	7	10	23	50	193

Psilocybin



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
sekundární droga	18	20	28	47	106	92	85	63
základní droga	3	2	3	6	9	4	5	7

Rozpustidla



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
sekundární droga	123	96	87	97	65	123	104	110
základní droga	326	274	167	209	166	161	147	171

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Trendy prvně léčených uživatelů drog
ČR, 1995 - 2002
Trendy počtu nově evidovaných problémových uživatelů drog 15 - 39 let, injekčních uživatelů drog, uživatelů opiátů a stimulancií / 10 000 obyvatel v Praze



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Trendy prvně léčených uživatelů drog
ČR, 1995 - 2002
Trendy počtu nově evidovaných problémových uživatelů drog 15 - 39 let, injekčních uživatelů drog, uživatelů opiátů a stimulancií / 10 000 obyvatel ve Středočeském kraji



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Trendy prvně léčených uživatelů drog
ČR, 1995 - 2002
Trendy počtu nově evidovaných problémových uživatelů drog 15 - 39 let, injekčních uživatelů drog, uživatelů opiátů a stimulancií / 10 000 obyvatel v Jihočeském kraji



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Trendy prvně léčených uživatelů drog
ČR, 1995 - 2002
Trendy počtu nově evidovaných problémových uživatelů drog 15 - 39 let, injekčních uživatelů drog, uživatelů opiátů a stimulancií / 10 000 obyvatel v Plzeňském kraji



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Trendy prvně léčených uživatelů drog
ČR, 1995 - 2002
Trendy počtu nově evidovaných problémových uživatelů drog 15 - 39 let, injekčních uživatelů drog, uživatelů opiátů a stimulancií / 10 000 obyvatel v Karlovarském kraji



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Trendy prvně léčených uživatelů drog
ČR, 1995 - 2002
Trendy počtu nově evidovaných problémových uživatelů drog 15 - 39 let, injekčních uživatelů drog, uživatelů opiátů a stimulancií / 10 000 obyvatel v Ústeckém kraji



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com







Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Trendy prvně léčených uživatelů drog
ČR, 1995 - 2002
Trendy počtu nově evidovaných problémových uživatelů drog 15 - 39 let, injekčních uživatelů drog, uživatelů opiátů a stimulancií / 10 000 obyvatel v kraji Vysočina



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Trendy prvně léčených uživatelů drog
ČR, 1995 - 2002
Trendy počtu nově evidovaných problémových uživatelů drog 15 - 39 let, injekčních uživatelů drog, uživatelů opiátů a stimulancií / 10 000 obyvatel v Jihomoravském kraji



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Trendy prvně léčených uživatelů drog
ČR, 1995 - 2002
Trendy počtu nově evidovaných problémových uživatelů drog 15 - 39 let, injekčních uživatelů drog, uživatelů opiátů a stimulancií / 10 000 obyvatel v Olomouckém kraji



© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com







Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Graf č.38

Virové hepatitidy A, B a C
ČR, 1997 - 2002
Virová hepatitida A - trend podílu osob s rizikovým chováním podle věkových skupin nemocných



	0	1 – 4	5 – 9	10 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	64 – 74	75 +	Celkem
1997	0	1,3	0,8	3,4	45	31,5	15,9	4,9	5,4	0	0	0	19,3
1998	0	0	0	1,8	46,4	42,7	21,8	8,5	1,7	0	0	0	23,6
1999	0	0	0	2,3	50	36,7	17,3	3,3	2	0	0	0	16,6
2000	0	0	0,7	4,8	19	9,1	3,3	10,3	0	0	16,7	0	4,7
2001	0	0	0	0	35,5	19	3,8	4,2	0	0	0	0	6,8
2002	0	0	0	0	22,2	17,6	0	8,3	0	0	0	0	4,7

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Graf č. 39

Virové hepatitidy A, B a C
ČR, 1997 - 2002
Virová hepatitida B - trend podílu osob s rizikovým chováním podle věkových skupin nemocných



	0	1 – 4	5 – 9	10 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	64 – 74	75 +	Celkem
1997	0	0	0	16,6	29,7	20	17,9	7,8	0	0	0	0	10,8
1998	0	0	0	0	59,2	48,8	25,7	10,9	2,4	0	0	3,1	22,8
1999	0	0	0	25	58	53,8	35,6	20	10,2	1,8	0	0	29,1
2000	0	0	0	8,3	64,6	58,3	43,3	13,8	3,7	2,1	0	0	33,9
2001	0	0	0	0	62,1	59,5	37,8	18,6	4,7	0	0	0	33,1
2002	0	0	0	0	54,4	49,5	22,4	24	5	0	0	0	27,1

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Graf č.40

Virové hepatitidy A, B a C
ČR, 1997 - 2002
Virová hepatitida C - trend podílu osob s rizikovým chováním podle věkových skupin nemocných



	0	1 – 4	5 – 9	10 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	64 – 74	75 +	Celkem
1997	0	0	0	0	88,1	77,4	63,9	10	10	0	0	0	57,7
1998	0	0	0	100	87,1	76,5	60,3	42,9	0	10	0	0	65,5
1999	0	0	0	100	81	81,1	64,7	50	0	0	0	0	67,2
2000	0	0	0	33,3	88,3	82,1	77,8	54,5	36,4	0	0	0	73,4
2001	0	0	0	66,7	85,2	66,2	76,6	45,5	13,3	0	0	0	66,3
2002	0	0	0	0	80	75,9	54,2	31,6	20	0	0	0	59,6

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Graf č.41

Virové hepatitidy A, B a C
ČR, 1997 - 2002
Podíl injekčních uživatelů drog
mezi nemocnými virovou hepatitidou A, B a C



	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Virová hepatitida A	17,9	20,4	15,3	2,9	1,5	4,7
Virová hepatitida B	8,3	18,6	23,6	27,2	28,2	27,1
Virová hepatitida C	52,7	61,1	64,1	68,3	60,5	59,6

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Graf č.42

Intoxikace v souvislosti s užitím drogy
ČR, 1995 - 2002
Trend podílu skupin základní drogy



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Neznámá	4	43	20	20	8	16	20	13
Jiné drogy,léky	77	164	172	223	164	184	182	179
Sedativa,hypnotika	207	379	381	303	204	260	332	226
Rozpustidla	68	54	47	78	59	67	75	58
Halucinogeny	5	4	4	15	17	25	22	9
Kanabinoidy	17	18	24	50	51	64	63	101
Pervitin,stimulancia	74	86	159	179	164	134	186	209
Heroin,opiáty	37	137	192	230	274	235	303	205

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Graf č.43

Intoxikace v souvislosti s užitím drogy
ČR, 1995 - 2002
Trend podílu věkových skupin intoxikovaných osob



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
neznámý		7	6	1	2	2	2	0
40 a více let	85	173	170	171	113	161	185	170
25 - 39 let	133	234	276	271	238	266	353	318
20 - 24 let	104	183	253	299	270	271	338	268
15 - 19 let	150	252	254	306	268	236	266	215
do 15 let	17	36	40	50	50	49	39	29

© Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2003

HLAVNÍ ZÁVĚRY D I S ZA ROK 2002

- **informace o léčených uživatelích drog získány z 96 % všech L/K center z celé ČR**
- **incidence léčených uživatelů drog každoročně stoupá**
- **počet nově evidovaných klientů za rok 2002 byl 4719 osob, tj. 45,9/100 000 obyvatel**
- **věkově specifická incidence ve skupině 15 – 39 let byla 4 460 osob, tj. 118,1/100 000 obyvatel**
- **prevalence všech léčených uživatelů drog byla 9 237 osob, tj. 89,9/100 000 obyvatel**
- **věkově specifická prevalence ve skupině 15 – 39 let byla 8 760 osob, tj. 231,9/100 000 obyvatel**
- **jako problémové uživatele drog dle definice EMCDDA lze klasifikovat 3 472 osob, tj. 73,6 % ze všech žadatelů o první léčbu, mezi všemi klienty to je 7 441 osob, tj. 80,6 %**
- **provedený odhad všech problémových uživatelů drog v celé populaci je 34 300 osob v roce 2002; z toho je 23 100 mužů a 11 200 žen, 10 900 uživatelů opiátů, 21 200 uživatelů amfetaminů a 2 200 ostatních problémových uživatelů drog, odhad injekčních uživatelů drog je 28 800 osob**
- **v průběhu roku 2002 došlo k nárůstu počtu léčených uživatelů pervitinu a naopak k poklesu léčených uživatelů heroinu**
- **poměr mužů a žen mezi nově evidovanými a všemi léčenými klienty je shodně 2,1 : 1, pouze v obou nejmladších věkových skupinách mezi léčenými uživateli pervitinu převládají ženy (poměr mužů a žen je 0,8 – 0,9 : 1)**
- **průměrný věk léčených uživatelů drog se zvyšuje**
- **počty injekčních uživatelů drog se každoročně zvyšují**
- **mezi nově evidovanými klienty v roce 2002 jich bylo 2 760 osob (tj. 58,5 %), mezi všemi klienty 6 225 osob (tj. 67,4 %)**
- **uživatelé heroinu převládají v Ústeckém kraji, Praze a Jihočeském kraji, v ostatních krajích dominují uživatelé pervitinu**
- **zhruba 55 % léčených uživatelů drog užívá kromě základní drogy i 1 – 2 drogy sekundární, jako sekundární droga je užíván nejčastěji pervitin, heroin a marihuana**

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

- **v posledních letech se podíl injekčních uživatelů drog mezi nemocnými virovou hepatitidou C pohybuje kolem 60 %, vyšších hodnot dosahuje ve věkových skupinách, kde je evidováno i nejvíc léčených uživatelů drog z L/K center**
- **počty identifikovaných HIV pozitivních injekčních narkomanů zůstávají stále velmi nízké**
- **sentinelový způsob sledování intoxikací v souvislosti s užitím drogy ukazuje na zvyšující se podíl intoxikací stimulancii (především pervitinem) a opiáty (především heroinem)**

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com