

Dotazník postojů/spokojenosti personálu (CAS)

Cílem tohoto sebehodnotícího dotazníku je dokumentovat postoje, odborné znalosti v oblasti metadonové udržovací terapie a spokojenost personálu v práci.

Vyplňte prosím **1** pro “nesouhlasím”, **2** pro “nevím” a **3** pro “souhlasím”.

Postoje a názory na závislost

- 1 Moderní společnost je příliš tolerantní vůči drogově závislým.
- 2 Dospělí odsouzení za prodej heroinu nebo kokainu nezletilým by měli být odsouzeni na doživotí.
- 3 Na osoby odsouzené za prodej nelegálních drog by se nemělo vztahovat podmíněčné propuštění.
- 1 Marihuana by měla být legalizována.
- 4 Lidé, kteří se stanou závislými na heroinu, za to mohou dávat vinu jen sami sobě.
- 5 Metadon není nic jiného než náhražka jedné drogy za druhou.
- 6 Výměna jehel/injekcí by měla být zavedena ve všech městech, kde je znám velký počet injekčních uživatelů drog.
- 7 Lékaři by měli být oprávněni předepsat heroin pacientům závislým na narkotikách.
- 8 Metadonová udržovací terapie značně zmírňuje zdravotní, sociální a právní důsledky závislosti na narkotikách.
- 9 Drogová závislost je zlozvyk.
- 10 Drogově závislí jsou slabí lidé, kteří nemohou odolat pokušení užívat drogy.

Orientace na abstinenci versus orientace na udržovací terapii

- 11 Hlavním cílem metadonové terapie by měla být abstinence od všech narkotik (včetně metadonu).
- 12 Pacientům v metadonové léčbě, kteří stále užívají heroin, by měla být snížena jejich dávka metadonu.
- 13 Množství času, který osoba legálně stráví v metadonové terapii, by nemělo být nijak omezeno.
- 14 Pacientovi by měla být postupně snižována dávka metadonu, jakmile přestane užívat heroin.
- 15 Pacientům v metadonové léčbě by měla být poskytnuta jen taková dávka, která zabrání abstinčním příznakům.
- 16 Je neetické pacienty udržovat na metadonu do nekonečna.
- 17 Pacientům v metadonové terapii, kteří opakovaně nedodrží schůzky s poradcem, by měl být metadon postupně odnímán.
- 18 Po období stabilizované metadonové terapie by pacienti měli být podporováni v tom, aby postupně přestali užívat metadon.
- 19 Pacientovi by mělo být umožněno, aby zůstal v metadonové terapii tak dlouho, jak chce.
- 20 Pacient by měl být na metadonu jen po dobu detoxikace od nelegálních opiátů.
- 21 Metadonová terapie by měla být časově omezená (např. méně než šest měsíců nebo méně než jeden rok).

- 23 Pacienti na metadonu, kteří ignorují opakovaná varování, aby přestali užívat heroin, by měli být vyloučeni z léčby.
- 24 Služby metadonové terapie by měly být rozšířeny tak, aby se jí mohli účastnit všichni závislí na heroinu, kteří ji chtějí podstoupit.
- 25 Závislí na heroinu by měli nastoupit dlouhodobou udržovací terapii pouze poté, co krátkodobá nebyla úspěšná.
- 26 Pacienti v metadonové terapii, kteří nepřestali užívat nelegální drogy, by měli být propuštěni, aby uvolnili místo jiným, pro něž bude terapie pravděpodobně přínosnější.
- 27 Pacientům v metadonové terapii, kteří stále užívají kokain, by měla být snížena dávka metadonu.
- 28 Závislí na heroinu by měli být přijati do metadonové terapie pouze v případě, že alternativní způsoby léčby nebyly úspěšné.
- 29 Pacienti přistižení při prodávání nebo obchodování se svými dávkami metadonu by měli být okamžitě propuštěni.
- 30 Pacienti v metadonové terapii, kteří nepřestali injekčně užívat drogy, by měli být propuštěni, aby uvolnili místo jiným, u nichž je větší pravděpodobnost, že omezí své rizikové chování související s přenosem HIV.
- 31 Pacienti v metadonové terapii, kteří ignorují opakovaná varování, aby přestali užívat kokain, by měli být z terapie vyloučeni.
- 32 Pacienti užívající vysoké dávky metadonu by měli dostat méně "dávek na doma", než pacienti užívající nízké dávky.
- 33 Pacienti v metadonové terapii, kteří si stěžují na svůj program, by měli být vyzváni, aby program opustili.

Negativní názory na pacienty

- 34 Mnoho pacientů si tu chce jen dát pauzu od shánění drog (doopravdy se závislostí na heroinu nechtějí přestat).
- 35 Mnoho pacientů tu poctivě pracuje na svém uzdravení.
- 36 Mnoho pacientů tu obecně nespolupracuje.
- 37 Většina závislých na heroinu užívá drogy, protože musí, ne protože chtějí .

Nesprávné lékařské informace

- 38 Metadonová udržovací terapie může způsobit poškození jater.
- 39 Metadon je pro nenarozené dítě nebezpečnější než heroin.
- 40 Stabilní dávky metadonu vážně ovlivňují schopnost řídit auto a obsluhovat stroje .
- 41 Metadonová terapie zvyšuje závažnost předcházející deprese.
- 42 Metadonová terapie může způsobovat poškození ledvin.

Spokojenost s pracovním prostředím

špatné

přiměřené

dobré

- 43 Jak byste zhodnotil/a svůj plat a výhody?
- 44 Jak byste zhodnotil/a dostupnost využitelného prostoru ve vašem programu?
- 45 Jak byste zhodnotil/a vedení a podporu vašeho přímého nadřízeného?
- 46 Jak byste zhodnotil/a podporu ředitele

- vašeho centra/programu?
- 47 Jak byste zhodnotil/a koordinaci poradenství a lékařských služeb?
- 48 Jak byste zhodnotil/a účinnost léčby ve vašem programu?
- 49 Jak byste zhodnotil/a podporu, kterou dostáváte od jiných poradců?
- 50 Jak byste zhodnotil/a spolupráci se svými pacienty?
- 51 Celkově, jak spokojený/á jste se svým zaměstnáním?

Kód programu	Kód personálu	Kód tazatele	Datum
--------------	---------------	--------------	-------