

PREVALENČNÍ ODHADY PROBLÉMOVÝCH UŽIVATELŮ

DROG V ČR - SOUHRNNÝ ČLÁNEK

MUDr. Viktor Mravčík

Mgr. Pavla Lejčková

Mgr. Blanka Korčíšová

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

Abstrakt

Jsou prezentovány prevalenční odhady problémového užívání drog provedené v ČR od r. 1999. Byly použity 2 standardní metody – multiplikační metoda a metoda zpětného záchytu. Navíc byl za r. 2003 proveden odhad problémových uživatelů opiátů prostřednictvím dotazníkové studie mezi praktickými lékaři.

Dosavadní výsledky ukazují klesající trend v prevalenčních odhadech, toto zjištění je podporováno faktem, že odhady byly provedeny různými nezávislými institucemi. Na klesající počet odhadovaných problémových uživatelů má velmi pravděpodobně vliv rozšiřování substituční léčby v ČR a odliv uživatelů do tohoto typu služeb, který není registry používanými pro prevalenční odhady dostatečně podchycen.

Počet problémových uživatelů drog se v r. 2003 podle metody odhadu pohyboval velmi pravděpodobně v rozmezí 21 až 38 tisíc osob. Nejpravděpodobnější je počet kolem 30 tisíc, z toho cca 11 tisíc uživatelů heroinu, 19 tisíc uživatelů pervitinu, 28 - 29 tisíc injekčních uživatelů.

Klíčová slova: prevalenční odhad, problémové užívání drog, metodologie, multiplikační metoda, metoda zpětného záchytu, dotazníkový průzkum, substituční léčba